

4.

DE CRISIBVS  
AD GALENI CENSVRAM  
LIBER

OMNEM CRISIVM COGNI-  
tionem breui, & miro ordine  
continens.

HIPPOLYTO SALVIANO  
A V T H O R E.



4

ROMAE  
1556.



3  
ILLVSTRISS. ET REVEREN-  
DISS. IO. MORONO  
CARDINALI  
amplissimo,

Hippolytus Saluianus S.



VAM prudens habitū fue-  
rit veterum scriptorū confi-  
lium, qui quę ipsi inuenissēt,  
monumentisque literarum  
mandassent, alicui claro ac  
primario viro dicarunt; eo  
in primis argumento perspicui potest, quod  
diuturna hęc est consuetudo, & cōstanter  
retinetur. Neque sanē iniuria (meo quidem  
iudicio) nam qui aliquid constituit edere;  
is non solū id dicando, potest aliqua ex  
parte ei, cui sit beneficio aliquo deuinctus,  
gratiam referre, sed libro quoque authori-  
tatem ac splendorem addere, eius præscri-  
pto nomine, cuius is quasi auspicio in ho-  
minum exeat manus. Ab hoc ego antiquo  
optimo receptoque instituto, in hoc meo  
de Crisibus libro edendo, mihi discedendū

A ii

non putavi; cum præsertim nõ vt plerisque aliis scriptoribus ambigua illa mihi delibe-  
ratio accidat, cui potissimum ex multis, qui & ipsi de me optimè meriti occurrunt, de-  
beam offerre hoc quicquid est muneris, qui-  
ta sum tibi, tuis maximis & clarissimis be-  
neficiis obstrictus, vt nulli alii quàm tibi ha-  
sce vigilias meas dicare debeam. Etenim  
præterquam quòd tu me in domesticis meis  
difficultatibus tua liberalitate subleuasti,  
etiam apud multos, non solùm amplissimi  
istius senatus, præstantissimos viros, sed &  
aliorum ordinum, in exultatione & gra-  
tia (quoties res ipsa tulit) honestissima tua  
prædicatione posuisti; Quare cum tantum  
tibi debeam, quantum omnes intelligunt,  
cuiam potius non hos tantùm labores,  
sed industriam etiam omnem meam, atque  
omnia studia dicem, quàm tibi **CARD.**  
amplissime? Iam verò si illud quoque spe-  
ctandum est, vt in his principi alicui viro di-  
candis existimatio & gratia libro compare-  
tur, à quonam hæc ipsa certius sperare po-  
tui, quàm abs te **ANTISTES** Opt: Quem  
omnes meritò admirantur & obseruant,

non solum ob istam tuam amplissimam dignitatem, sed multo etiam magis ob vitæ innocentiam, animi integritatem, eximiam rerum omnium doctrinam, in bonos omnes doctosque benevolentiam, in pauperes misericordiam, & denique in omnes omnium generum atque ordinum viros, humanitatem; Quæ summa in te omnia & ita egregia inueniuntur, ut non magis tu ab istius amplissimi ordinis dignitate orneris, quam ille admirabili tuarum virtutum splendore illustretur; Nec hic ego vereri debeo, ne cui videar tibi adulari (quæ sanè res, à meis moribus omnino abhorret) si quidem omnes boni, omnes docti (nam reliquorum iudicium nihili facio) omnes inquam illi qui te optimè norunt, qui plurimi quidem sunt, una voce, me potius iniquum dicent, quod de tuis virtutibus parcius dixerim, quam quod magnificentius extulerint, adulatorem; Quamquam id mihi propositum non fuit, ut enumerarem laudes tuas, quæ & otium maius, & dicendi facultatē vberiore, volumēque potius, quam epistolā postularēt; Suscipe igitur C A R D.

A. iii.

**Illustriss.** hunc librum meū mole quidem exiguum, præstantia verò rerum, quas continet, maximum; quem nunc foras auspiciis tuis emitto; atque pro tua facilitate patiare, vt ei se honestare tuo clarissimo nomine liceat, & gratiosiorē reddere, cōtrāque maleuolorum iacula, scuto veluti quodam armare atque defendere; Quod si assequar, vt quidem spero, dabo operam, vt plerique alii mei medici libri, eisdem tuis auspiciis in lucem prodeant. Vale:

Romę Cal. Aprilis, Anno  
salutis nostrę 1556

7

# CANDIDO ET STUDIOSO

LECTORI HIPPOLYTUS SAL.

VIANVS IN ALMO ROMANO

*gymnasio practicae medicinae ordinan-*

*vis professor. S.*



**Q**UONIAM medicinae par-  
tium (nam in partes plures  
medica diuiditur facultas)  
eā quę futuros morborum  
pręuidet euentus, nobilissi-  
mam atque maximè necessa-  
riam esse, facillè intelligi potest; Nam cum  
aliarum quęlibet absque reliquarū cogni-  
tione acquiri posse videatur (etsi enim nul-  
lam aliam attigerint, nonnullos simplicia  
cognoscere medicamenta, alios humana  
secare corpora, quosdam de morborū dif-  
ferētiis, causis, atque symptomatibus disse-  
rere, multos chirurgiam exercere, & ple-  
rōsque morbis demum omnibus mederi,  
videmus) prognosticam partem solam ne-  
mo adipisci poterit vnquam, ni in reliquis  
etiam omnibus prius versatus fuerit; Prę-

A iiii

terea cum vniuersa ars medica, atque pars  
 eius singula, tum rationibus ex vetustissi-  
 mis ac clarissimis authoribus petitis, tum  
 experimentis diuturna obseruatione com-  
 probatis, perdisci re vera debeat, cum que  
 eo ignorantie deuenierint nonnulli, vt non  
 solum aliquam huius artis partem (vt Her-  
 barii, Pharmacopole, ac omnes fere nostre  
 etatis Chirurgi) sed eam etiam totam (vt  
 quamplures sumptuosis vestibus, pretiosis  
 annulis, honorifico famulorum comitatu,  
 & faceta loquacitate veram medicinam e-  
 mentientes) empiricè tantum addisci atque  
 exerceri posse (maximo hominum detri-  
 mento) contendant, alii verò eo vsque in-  
 sanierint, vt omni exercitatione neglecta,  
 & quouis particulari vsu posthabito, ex so-  
 lis commentariolis medicinam (haud mi-  
 nore humani generis iactura) facere au-  
 deant; hæc vna medicine pars, huiusmodi  
 perditissimis abusibus se deprauari non pa-  
 titur, cum nemo possit, nisi rationes ex com-  
 mentariis decerptas, innumeris adiunxe-  
 rit experimentis, futura in morbis prædic-  
 re; Quod si eo audacie aut temeritatis ac-



cedat quispiā, ut vel ex empirica sola exercitatione, vel ex solis commentariis mortuorum euentus prædicere tentet, iis, qui non prorsus iudicio carent, suam audacem ignorantia citissimè deteget; Vnde si medicorum præstantia perpendenda sit, haudquaquam ex hilari fronte, ex decora facie, ex concinna barba, ex facunda & faceta dicacitate, ex grandiorive senio eam existimare debemus (quod non solum vulgares & plebei, sed Principes etiā atque Reges, (& quod maius est) docti quoque in aliis scientiis & facultatibus viri, faciunt) quum horum nullum medicæ artis peritiam testetur; Nec etiam ex numerosis ac variis præfidiis temerè & absque ratione admotis & exhibitis, quo astu gregales medici miseris hominibus imponentes, egregii esse falso creduntur; Nam præter quàm quòd sæpe innumera hæc præsidia naturæ negotium potius faceffunt, quàm opem ullam ferant, ut quæ paucis rationi consentaneis, atque morbo congruis, subleuari soleat; quilibet peritus aromatarius, hac ratione præstantissimus cæseri medicus posset, quippe qui non

secus quàm quia is medicus plurima atque  
 inconsultò præscribere remedia possit; Nec  
 minus ex eo, quòd egri, quibus medentur, sa-  
 nati sint, cum validum naturæ siue virium  
 robur grauissimos etià morbos, vel aduer-  
 sis admotis medicamentis, sæpe vincēs atque  
 curans, apud homines ab euentu iudican-  
 tes, eos, qui iurè maxima digni essent infam-  
 ia & dedecore, in summa gratia & existi-  
 matione perperà collocet; sed ex sola præ-  
 sagiendi peritia, in qua neque vllò astu vsi,  
 neque viriū robori aut naturæ solertiæ fisi-  
 nos decipere vulgares medici possunt; Po-  
 stremò vt author est diuinus Hippocrates  
 medicum præsentione vti, optimū est; Nam  
 vt idem subdit, præsentiens enim & prædi-  
 cens coram egro præsentia (antequam vi-  
 deat) præterita (quæ neque viderit, neque  
 audierit) & futura; creditur agnoscere egri  
 conditionem; Ex qua quidem existimatio-  
 ne non solùm admirabilior redditur, sed  
 vt subiunxit Hippocrates, Hinc audent ho-  
 mines magis se concedere medico; Et  
 quemadmodū hæc confidentia medicis præ-  
 ceptis obsequētiores fiunt, ita facilius pri-


fine restituuntur sanitati. Verum non so-  
 lum hac ratione, sed per se etiam curandis  
 morbis necessaria est presentio; Vnde idē,  
 Ita curationē optimē molieris prenoscen-  
 do futuras affectiones, iure subnexuit. Me-  
 dicus nanque & presentes & futuras egri  
 cognoscens affectiones, uti eas, quę ad-  
 sunt, rectē curat, sic futuras prohibet prorsus,  
 aut minores saltem efficit; ceu bonus gu-  
 bernator per futuram tempestatem omni-  
 bus prospiciens atque omnia precauens;  
 tum aliis medicis presidis, tum congrua vi-  
 tus ratione; quę sicuti in omnium morbo-  
 rum curatione maximē necessaria est, sic  
 absque futuri status cognitione, ritē nun-  
 quā prescribi potest; Et demum ut idem  
 nobis testatur, Cum fieri non possit ut o-  
 mnes in sanitatem egri perducantur, etsi  
 id melius foret, quā futura presentire; qui  
 presentione uti potest, morituros, evasu-  
 rosque prenoscens ac pronuncians, culpa  
 vacabit. Cum igitur prestans adeo atque  
 necessaria medicis sit presagiendi facultas,  
 iurē Galenus noster, preter quatuor libros  
 de precognitione ex us, tres commē

tarios in prognostica Hippocratis, atque  
 librum de præcognitione ad posthumum,  
 alios libros tres de Crisibus inscriptos, nô-  
 bis reliquit; In quibus febrium (vt quæ &  
 frequenter admodum, & grauissimè huma-  
 na inuadant corpora) præcognitionē edo-  
 cet. Verùm cum Galenus (& si medicam  
 artem omnem absolutè adeò nobis tradi-  
 derit, vt dubio procul illam totam ei refer-  
 re debeamus acceptam) hos suos libros si-  
 cuti & reliquos ferè omnes, ea prolixitate,  
 atque eo docendi ordine conscripserit, vt  
 illa laboris impatientes, hoc verò hebetio-  
 ris ingenii homines iurè deterreat, atque  
 ab eias lectione arceat; quemadmodū alios  
 eius nōnullos, ita & hos de Crisibus inscri-  
 ptos libros, ad minorem magnitudinem  
 atque faciliorem ordinem redigere enixi  
 sumus, & que ea lege efficiendum suscep-  
 imus, vt nihil sciri necessarium, aut ad  
 uersione dignum ab ipso proditum, omit-  
 teremus; Quod cum in plerisque libris eius  
 huc vsque præstiterimus, & si amici quidam  
 vt hosce conatus nostros ederemus, horta-  
 rentur; hæc tamen omnes, quos bre-

uiores, ac faciliores hætenus reddidimus, promulgandos duximus; Tutius esse arbitrati eorum vno, quæ ipsorum omnium futura sit cõmunis opinio, experiri, si is enim placebit, reliquos omnes etiam probandos esse credendum est, cum eadem breuitate, facilitate atque ordine singuli conscripti sint, vnde quod ad hæc attinet, si vnum noris, omnes noris; Et quo me minus mea falleret opinio, hoc periculum faciendum duximus, illius nostri libri editione, qui præ ceteris, longitudine, difficultate atque varietate eorum, quæ continet, prolixior, obscurior, & minus ordine digestus esse deberet, cuiusmodi hic est, quem nunc foras damus, de Crisibus, siue de morborum mutationibus inscriptus; Qui præterquam quòd sicuti tribus illis Galeni de crisibus, triplo minor est, sic omnia scitu necessaria in illis à Galeno tradita (ne vllò quidem prætermisso) complectitur; eo etiam conscriptus est ordine, vt quilibet vel mediocris ingenii eum facillimè intelligere possit; Hunc igitur hilari fronte suscipe, candidoque animo perlege studiose lector, quantumque

hæ nostrę lucubrationes in medium allatu  
 re sint utilitatis & commodi, æquo animo  
 æstimato, Illorum enim iudicium, qui (vel  
 quod sic sentiant, vel quod ita Galeni vide  
 ri velint studiosi) eo usque Galeni scriben-  
 di modum extollunt, vt ne verbū quidem  
 addi minuiue posse temere contendant,  
 floccipendo; Cum vti Galenus in medica  
 tradenda facultate, iurè ac citra cōtrouer  
 siam medicorum omnium princeps  
 statui debet, sic haud vndequaque  
 eius laudandus est scribendi  
 modus, quippe quem se  
 pissimè prolixiorē  
 quàm par sit,  
 aliquando  
 verò  
 & obscuriorem esse,  
 nemo sanę mentis nō intelligit.







17

CRISIVM SIVE MVTATIO-  
NVM MORBORVM PRAECO-  
GNITIO, EX VNIVERSALIVM  
*morbi temporum praecidentia exoritur.*

CAP. I.



VLTIPLICES cū sint mor-  
borum mutationes, quibus  
vel ab ipsis morbis solvitur,  
vel diem obimus, horūque  
cum vtrumq; nunc subitò, nunc paula-  
tim, nunc verò partim subitò, & partim  
paulatim accidere conspiciatur, Gene-  
rosū medicū ac hypocratica arte  
dignum, harum omnium morborū mu-  
tationum vniuersas differentias, præsē-  
tes quidē cognoscere, futuras verò prae-  
uidere operepretium erit, Sic enim non  
solūm rationabilius medendi fungetur  
munere, sed etiam omni prorsus crimine  
ac calumnia vacans, tum ægris, tum a-

B

sistentibus omnibus excellentior, admirabiliórque videbitur. Quamobrem quæ ratione, cognitio & præsensio hæc acquiratur, hoc decreuimus inquirere libro. Erit autem optimum inquisitionis huius initium, ipsorum vniuersaliũ temporum morborum, præsentium quidem cognitio, futurorũ verò præsensio, quando nisi hæc dum adsunt, cognoscantur, dum verò adhuc futura sunt, præuideantur, de ipsis morborũ mutationibus, vel præsentibus vel futuris quidpiam certi pronunciare non liceat, vt clarius in sequentibus monstrabitur. Singula igitur totius morbi tempora, quo pacto præsentia cognoscere, ventura verò præsentire valeamus, docere primũ aggrediamur, deinceps verò de vna quaque mutatione in morbis differentia agere prosequemur.

*Vniuersalia morbi tempora quibus dignoscantur.*

Cap. II.



QUATVOR esse totius morbi tempora, principium. s. augmentum vigorem & declinationem, sicuti & quæ sit singulorum natura, proprio loco monstratum est, qua verò ratione tum ea, dum adsunt, cognoscere, tum adhuc futura præuidere, conueniat, impræsentiarum docere oportet. Quæ quidem tempora cum dierum numero (vt quispiam forte extimauerit) non diffiniantur, (fieri enim nequit, vt morbus quatuor diebus finiturus, æqualia dierum numero habeat tempora, cū eo qui vsque ad diem quadagesimū extendi debeat) difficilis eorum redditur cognitio, nec quomodo iudicanda sint, omnes inuicem cōcordant, quinimo nec desunt, qui ea nullo modo

B ii

præsciri posse contendant . Ego autem cum tantum absum, ut quod futurum sit penitus incognitum putem , ut de eo non solum artificiosam cōiecturā, sed etiam certissimam sæpe scientiam haberi posse existimem . Iam id qua fiat ratione aperiam, ab ipso Hypp. rei huius duce exordiens . Qui cum in aphorismis inquit , accessiones & constitutiones narrant morbi, anni tempora, & circuituum inuicem incrementa , siue quotidie , siue alternis diebus , siue etiam longiori fiant tempore , sed & ex mox apparentibus coniectare oportet, & reliqua ; per morborum constitutiones quandam ueluti eorum formam , secundum quam ex talibus & tantis cōstituantur uniuersalibus temporibus , ipsum intelligere, facili cōprehendi coniectura potest ; Nam cum in primo Epidimiarum dixisset ; sunt autem species modi & constitutiones & ac

cessiones harum quarumlibet febrium. Deinceps subiunxit, Statim enim continua ueluti incipiens florescit ac uiget, & plurimum ad difficilius attollitur, circa autem crisim, & unà cum crisi extenuatur; Est autē quibus incipit ueluti mollis ac latens, resurgit autem atque exacerbatur singulis diebus, circa crisim verò satis emicat; Quibus verbis manifestè ostendit, se qualemcunque ex totius morbi temporibus compositionem, constitutionem nominare, Quamobrem cum & in præcitato aphorismo per morborum constitutiones, uniuersalia eorū tempora intelligat, eorundem temporum cognitionē quatuor inditiorum generibus haberi docet, morbo. s. ipso, anni tempore, circuituum a diuicem incrementis, & ex mox apparentibus; Verum cum hoc compendium rerum sit, quæ in pronosticis liquidò scribuntur,

(confuevit enim Hypp. sola capita, eorum, quæ in libro particulatim traduntur, in aphorismos transferre,) quo pacto horum inditiorum quodlibet uniuersalia conuoluet tempora, inquiramus; Et cum huiusmodi temporum præsentium quidem cognitio, futurorum uero præuidentia acquirēda sit, ac horum signorum aliqua vel præsentium cognitionē magis, vel futurorum præscientiam solum nobis largiantur, alia uero æque utranque tribuere possint; particulatim de singulis agentes, quid eorum unumquodque significet, & quo modo, lucidè pertractare conabimur, ab ipso morbo exordientes.

*Qua ratione morbi uniuersalia declarent tempora.*

*Cap. III.*



VM morbos ipsos primùm no-  
bis vniuersalia demonstrare  
tempora doceat Hyppocra-  
tēs; Ex ipsis non quale præ-  
sens morbi tempus sit, cognoscimus;  
sed solum quousque quæ adhuc futura  
sunt, extendi debeant, præuidemus;  
Verùm cum in morbis & species, & ma-  
gnitudo, & mos, & motus, abinuicem  
distincti reperiantur, num his omnibus,  
vel horum aliquibus, vnó ve, futura mor-  
bus innuat tempora, perscrutari opor-  
tet; comodè autem perscrutabimur, si  
ea quæ de eorum quolibet fusius alibi  
diximus, nunc breuius in memoriam re-  
uocabimus; Morborum itaque species  
sunt tertiana, quotidiana, quartana, se-  
mitertiana, pleuritis, peripneumonia,

B iiii

phrenitis, & huiusmodi, quarum quælibet quam primùm etiam inuadens, à perito medico ex propriis dignoscitur accidentibus. Magnitudo verò est morbi uehementia, quæ priorum morbi accidentium quantitate & numero iudicatur. Mos autem in eo quòd benignus malignusue sit morbus, cõsistit; ex symptomatibus morbum insequentibus nobis innotescens; Ab his omnibus demum motus differt, qui ex tempore partium accessions comprehenditur. Nam si accessio omnia sua tempora celeriter peragat, velocem motum esse, manifestum est. At cum id intermittenti tantum contingat, (eam enim quæ celeriter omnia sua pertrãsit tempora, continuam esse, est impossibile, sicuti & quæ in temporibus omnibus prolixitatẽ seruat, intermittere,) in continuis, ac in intermitentibus, quarũ nõ omnia ce-



leriter peraguntur tempora cum status longior aliis temporibus extiterit, motus uelox est extimandus, si verò breuior fuerit, tardus quoque dicetur motus; Quibus sic distinctis, morbos sua specie, primùm futura præmonstrare tēpora, clarum est, quando quo calidior fuerit, eo etiam breuior extiterit, quantum verò à calliditate recesserit, tantum diuturnior reddetur. At cum morborum species aliquæ cum affecto inuadant loco, aliquæ verò circa alicuius certæ sedis noxam reperiuntur; in his quæ sine affecto loco sunt, noxii solū humoris naturam contemplantes, futura coniectabimus tempora; in quibus verò affecta quoq; sedes conspicitur, eiusdem etiam sedis naturam perpendere conuenit; Vnde si pituitosus humor fuerit, necessariò diuturnus morbus erit. Longa verò magis, si atræ bilis naturam referat, at si ad

flauam bilem pertinebit, non erit diuturnus; cum ob suam tenuitatem citius biliosi discuti consueuerint succi. Quam ob rem in intermittentibus tertiana cito terminatur, quotidiana verò longa est, adhuc etiam hac longior quartana; Pari ratione & in continuis ardentes quidem breuis temporis sunt, quæ verò typhodes. i. succendentes nominantur, Longiores, mediæ verò inter has semitertianæ; At si sedes quoq; affecta fuerit, ex eius etiam naturæ cognitione, haud paruum ad id habebis coniecturam; (quando & ratione partis affectæ, non paruum maioris ac minoris rationis differētiam circa auitatem ipsam recipiat morbus, si patiens namq; locus multo motu exerceatur, calidusq; sit, ac rarus, & principatum gesserit, acutiorē morbum fore portendit; qui verò nec in motu est continuo, frigidusq; ac densus, & sine

principatu, ad lōgius tempus cum, quo afficitur, morbum extendi debere significat ; qua propter lateralis morbus peripneumonia, phrenitis, & angina, acuti morbi sunt; tantóq; acutiores, quanto à calidioribus efficiuntur succis ; Morbus verò articularis, & coxendix, & renum dolores, longioris temporis extant; eóq; magis, quo à crassioribus humoribus pēdent ; Et sic morbi ex sua natura, vel specie, siue cum affecto loco inuascent, siue absq; patientis sedis noxa constiterint, futura prænunciant tempora ; Verùm cū iidem specie morbi non semper eadem motus velocitate moueantur, sed iste celerius, ille verò tardius moueri conspiciatur ; Morbus quisq; nō solūm sua specie, sed etiam & eo quo mouetur motu, futura commōstrabit tempora, quanto enim celerius mouebitur, tanto citius statum fore prænunciabit ; quanto vero tardius

moueri acciderit, tanto longius post tempus statum euenturum innuit. Tertianā igitur licet ex sui natura brevis sit temporis, quanto tamen mouebitur motu celeriori tāto reddetur breuior. Et quartana (alioquin natura sua diuturna) quanto velocius mouebitur, tanto minus erit diuturna. Morbi autem magnitudo ex se morborum constitutiones non declarat; ex accidēti verò nō inconuenit, vbi. f. motui celeritatē addiderit; Solet enim pluries morbi vehementia motus celeritatē augere. Similiter nec morbi mos per se vniuersalia denunciat tempora, sed solū ratione mox apparentium, quibus mos ipse distinguitur, de quibus infra latius agendum, quando nunc solūm quo modo morbi propria ratione suas constitutiones prædoceant, monstrare constitui- mus. Quod cū iam abundē docuerimus. Quemadmodum id quoq; anni tempo

ra præmoncant , perpendamus .

*Quo pacto anni tempora morborum ostendant  
constitutiones. Cap. IIII.*



**P**OST morborū Hypothefim,  
anni quòq; tempus vniuerfa-  
lia commoſtrat tempora; Ve-  
rū ſicuti morbus, ita & ipſum  
quoque tempus anni, non quæ ſint præ-  
ſentia tempora docet; ſed qualia, quan-  
tāq; quæ adhuc futura ſunt, eſſe debeāt,  
præmonet; Vnde non ſolū quartanam  
hoc inuaſiſſe die ſcire ſufficit, vt ab initio  
futurus præcognoſcatur ſtatus, ac tanta  
moueri motus celeritate, ſed etiam nūm  
hyeme, aut vere, vel æſtate, vel autumnō  
ſuum fecerit initium, proſpicere oportet;  
id cognoſcentes, quòd quartanæ, (vt di-  
cebat Hyppo,) æſtate magna ex parte  
breues ſunt, autumnales vero longæ, &

quæ magis hyemem attingūt; simili modo & tertiana febris, cum cito certe terminetur, citius tamē æstate, quàm hyeme finietur, Atq; aliis singulis morbis æstas celeritatem addit, hyems verò diuturnitatem, quod & Hypp. solūm de quartana morbo omnium longissimo mentionem in aphorismo uti de exemplo faciens, innuit; At cum non propter temporum anni appellationes, singulæ ægritudines tales vel tales, hoc vel illo tempore contingant, sed propter ambiētis nos aëris temperaturam, aduertere expedit, anni tempora secundum eam, qua pollent temperie, morborum constitutiones gignere; Vnde dicebat Hypp. cum ver autumno simile factū fuerit, autumnales ægritudines expectare oportet; quamobrem non omnis simpliciter æstas breues morbos parit, sicuti nec simpliciter hyems semper diuturnos, sed solum quādo propriis

afficiuntur temperamentis; propriam autem hyemis temperiem frigidā ac humidam, sicuti æstatis calidam atq; siccam esse iam statuimus; quare haud mirum est, si morbi omnes æstate quidem breviores fiant; inutiles enim humores funduntur, & per totū corpus dilati diffillantur, vnde in quibus vires validæ sunt noxiis euacuatis humoribus, morbi cessāt; In quibus verò imbecilles sunt, vnā cum ipsis euacuatis, ipsæ quoq; dissoluuntur; Pari modo vti æstate discuti humores, & vires resolui contingit; sic hyeme contraria eueniunt, & humores intus tamque in latebris remanere, & vires seruari robustas, quapropter diuturniores efficiuntur morbi, non enim soluuntur, manentibus iis, qui eos efficiunt humoribus; nec ægroti moriuntur viribus interim sufficientibus; Et sic quidem anni tempora morborum futuras prenunciant constitu-

tiones; Sicuti autem in anni temporibus; sic etiam & in reliquis consimilibus ex proportionem res sese habet, de quibus cū sæpe sæpius ipse Hypp. diseruerit, hic nihil eorum meminit, breuitati nanque studens, ex vno omnia alia ad memoriam nobis relinquens reuocanda; quæ enim tempus æstium, eadem & ægri temperatura, si calidior & siccior fuerit, & ætas si in suo constiterit vigore, & locus si calidus & siccus, vnà indicabunt, quinimo & vitæ industria, & assuetudo, & præsens nos ambientis aëris cōstitutio, eodem modo se habēt. Quibus omnibus, eadem ratione, quam in anni tēporibus docuimus, morborum poterimus futuras constitutiones præuidere, his autem sic declaratis, quomodo ex accessionibus quoque vniuersalia cognoscātur tempora querere prosequamur.

*Accessiones*



*Accessiones quo pacto morbi tempora narrent.*

Cap. V.



**P**RÆTER morbos ac anni tēpora, accessiones quoq; siue singulis diebus, siue alternis tantū, siue etiā longiori tempore fiant, morborum monstrare constitutiones præhabito scribitur aphorismo; ipsæ enim non solum præsentium temporum notitiam afferunt, quam maximè efficere solent, sed futurorum quoque nos docere possunt præensionem; Verum cū qua ratione istud efficiant non omnes inter se conueniant (respiciunt enim aliqui solū, num anticipent aut subsequantur accessiones, alii vero longitudinem solam considerant, & hi tantū ipsam aduertunt vehementiam,) in hoc etiam nos Hyppocratem ducē statuere, eiusq; insequi sententiam operepretium est; in-

C

quit itaque, vbi quo pacto quispiam ex circuitibus inueniat ægritudinis incrementum, docet; Accessiones esse inuicem conferendas, ac considerandum num celerius fiant, vel tardius, num ad longius vel breuius extendantur tempus, num et magis vel minus fiant. Quibus breuissimis verbis vt sui moris est, cognoscendorum temporum ex accessionibus vniuersam rationem innuit. Nam per celerius vel tardius fieri, nil aliud significat, quam num accessio solitam anticipauerit horam, tardiorue facta sit, considerandum esse. Et licet enim anticipatio sola per se ipsam sufficiens non sit incrementi signum, sicuti nec postposito declinationis (vbi sæpe morbi potius proprietatem insequantur, quam cius, vel augmentum vel declinationem, quartanæ enim tertianæ & quotidianæ, circuitus quidam statim ab initio ad integram usque solutionem sem

per vel anticipare, vel futuri temporis aliquid posterius assumere visi sunt,) nihilominus & in his plusquàm proportio exegit, vel anticipare, vel subsequi, alterum incrementi, alterũ declinationis indicium est, simpliciter autem anticipare, vel subsequi, neutrius. Quamobrem non solum, num secunda accessio cõsue tam anticipauerit horam aduertere conuenit; sed etiam nunquid (vt ipse dicebat Hypp.) ad longius extendatur tempus, vel ne. Attamen cum nec hæc tantum satis sit perspicere, reliqua quæ ipse per verba num magis vel minus fiant, innuit, perpendere oportet. Hæc autem sunt, vt præter accessionum anticipationem ac longitudinem; earum quoque & magnitudinem, & morem inspiciamus, num magis vel minus adsint, quàm in priori accessione fuerint, contemplantes; sic parietiam ratione, & declinationis & intermis-

sionis quoque tēpus considerandum est; ( vt quæ sint totius accessionis pars ) si longius vel breuius præcedente, aut tollerabilius aut minus tollerabile fuerit, aut si quod ex accessione symptoma remanserit, aut omnia cessauerint, animaduertentes; quorum omnium adhibita contemplatione, num morbos augeatur, vel minuat, vel in vigore consistat, facile accessionum ratione cognoscere valebimus; Namque si accessio consuetam anticipet horam, longiorque fiat, atq; vehementior, maligniorque & cum multis prauisque symptomatibus inuadat, & si etiam declinationis tempus breue fiat neque omnino facile, nec omnino casuum accessionis expers, neminem futurum arbitror, qui de hoc morbo num augeatur ambigat; Rursus si fiant his omnia contraria, tardet scilicet accessionis initium, longitudo verò & vehe-

mentia minor extet ; cesset etiam malignitas, & iis qui superueniunt casibus minoribus factis ac simplicioribus, vel omnino non superuenientibus, intermissione verò, vel declinatione etiam toleratu facili, ac longa succedente, omnesque accessionis casus auferent, manifestissima hæc erunt declinationis inditia, sicuti priora augmenti ; Cum verò quæ ad accessiones duas pertinent, æqualia fuerint, morbum consistere demonstrant. Licet tamen nonnunquam, & una omnibus aliis præcedentibus, reliquisque subsequenter, maior sit, in qua morbus consistit ; ad tres verò accessiones in acutis morbis status tempus extendi, non admodum accidit, in diuturnis, verò non solum ad totidem, sed etiam longè plurimas extenditur, semper autem accessionum æqualitate cognoscitur ; Verùm non solum ex acces-

sionibus præsentia tempora (hac quam inuenimus ratione) cognoscemus, sed etiam quæ adhuc futura sunt prævidebimus; Vnum enim quódque ex dictis sua quantitate id præmonstrabit; siquidem accessio plurimo anticipans tempore, & longius atque vehementius affligens, effatu dignum indicabit augmentum, & velocem esse morbi motum, atque haud ita multo post in suo vigore futurum. Neque. n. fieri potest, vt magna incrementa suscipientibus accessionibus, non proxima sit morbi consistentia; contraria verò accessio, quæ scilicet parua faciat incrementa, omnium eorum quæ diximus, quantum ad hoc attinet, longius distare futurum morbi vigorem ostendit; Cum itaq; qua ratione accessionum adinuicem incrementa, præsentis morborum constitutiones declarent, futuras verò prænuntient, do-

cuerimus, quomodo id quoque mox apparentia efficiant, iam perquirere agrediamur.

*Mox apparentia qua ratione morbi tempora  
indigent. Cap. VI.*



**U**NIVERSALIA morbi tempora quantum extendi debeant, ex morbis ipsis primum, demum ex anni temporibus, deinceps autem ex accessionū inuicem incrementis (his quas hactenus docuimus rationibus) cōiectari oportet. Verum cum hæc ad temporū morborum exquisitam cognitionem nō sufficiant, sed habeant aliquid tantum artificiosæ coniecturæ; si exquisitam a dipisci voluerimus notitiam, quod deinceps in præalegato aphorismo scribitur perpendendum erit; id autem est, ut præter

hæc omnia dicta , ex post apparentibus quoq; vniuersalia iudicemus tēpora , in quibus prima & præcipua signa sunt , quibus exquisitè valeamus præsentia quidem tempora cognoscere , futura verò præuidere (vtrūque enim mox apparentia efficiunt.) At cū mox apparentia generatim dicantur omnia symptomata , siue signa , quæ morborum inuasionem insequuntur , quarum alia assidentia , alia decretoria , alia cruditatis & coctionis & salutis & mortis , alibi vocari monstraui-  
mus ; ipsum de omnibus huiusmodi mox apparentibus hic non loqui , certum est (quando & assidentia & decretoria vocata signa nullam habeant constitutionem morborum iudicandi facultatem) sed de cruditatis & coctionis tantū signis intelligit ; Vnde & in fine aphorismi mox apparentiū , morborū constitutiones declarantium adducens exēplum , sputorum ,



vrinarum, & alui excrementorum tātum meminit, quæ omnia cruditatis & coctionis indicia existere, sicuti & quid coctio sit, alibi traditū est; Qua autē ratione huiusmodi coctionis signa præsentia morbi tempora narrēt, inquiramus primū, deinceps verò & quo modo futura quoque prænuncient, inuestigabimus. Non itaque artificiosa tantum coniectura, vti ex aliis antedictis, ex ipsis coctionis signis (quæ mox apparentia uocauit Hypp.) morborum cognoscimus præsentia tempora, sed exquisita quoque cognitione ac certa sciētia; idq; secundum eā quam in libro de morborum tēporibus rationē docuimus. Ea autē est, ut quousq; nō ad erunt manifestæ coctionis signa, adhuc morbi principiū perdurare cognoscas; cū manifesta coctione morbi finiri principiū, ibi traditū sit. Quā ob rē apparētibz uel cruditatis, uel debilis, occultæ ue

coctionis signis, principium adesse significatur. Est autem cruditatis nota, vrina aquea, debilis verò .vel occultæ coctionis, quando ex aquosa subpallida fuerit facta, & si turbulenta etiam apparuerit, talisq; permanserit, hæc quoque debilis coctionis est signum, & ruffa etiam & tenuis eiusdem generis est, quorum nullum principium iam finitum esse ostendit. Sic et in laterum & pulmonum passionibus, nihil omnino expuere, sed siccam tantūmodo tussim habere, tale quiddam est, quale in vrinis extreme crudum, quod aquosum nominauimus; quod si ab eo quod est nihil expuere, ad expuere, verū liquida & omnino cruda, fiat transmutatio, liquet quòd debilis & occulta est huiusmodi coctio, & nondum principium esse finitū, quando manifesta egeat finis eius coctione. Qua quidem manifesta coctione appa-

rente, morbi adesse augmentum percipimus, & quousque perfecta non apparuit coctio, continuo morbum augeri scimus. Signa autem manifestæ coctionis sunt, sola nebula alba, vel suspensio æqualis, continua atque alba, & etiam rubens nebula, & subsidentia talis, & sine subsidentia bene colorata vrina, & crassitudine mediocris, manifestæ coctionis est signum, quo incrementum morbi ostenditur. Simili modo & in sputis cum ex multis & aquosis, pauca & cocta expui ceperint, increfcit morbus, ac reliquo abhinc ad statum vsque omni tempore semper eo plura ac meliora & facilius expuente, incrementum augetur. Status verò cum tempus sit, in quo maximè coctiones fiant, dum vrget facile nobis coctionis ratione innotescit. Vbi. n. in generatione sanici dolores & febres augeantur, & maxima coctio, qualis in

morbi uigore perficitur, sanici generatio  
ni adsimiletur, cum quoq; vehementiora  
concomitari symptomata necessum est,  
quapropter dicebat Hypp. in principiis  
quidē & sine omnia sunt imbecilliora, in  
statu verò fortiora; & alibi, ubi morbus  
peracutus est statim extremos habet la-  
bores, quos cū adesse conspexeris, tunc  
maximè fieri coctionem coniicies, & per  
consequens incrementū præterisse, sta-  
tum verò in esse; quo etiam tempore per-  
fectæ coctionis signa intueberis. Nebula  
quidem sola, aut quibusdā bonis suspen-  
sionibus factis, status tēpus nondum ad-  
est, ac multo minus cum hæc ipsa defue-  
rint, nisi forte morbus valdè biliosus exti-  
terit. Perfecta igitur coctio est, cū in vri-  
nis subsiderit aliquid albū, leue, æquale,  
& continuum; similiter & sputa hoc tēpo-  
re exquisitè cocta, & multa, & siue diffi-  
cultate educuntur, sæpe tamen in morbis

nullum sensibile tempus inuenitur huiusmodi, sed habente adhuc quarta, (si ita contigerit) accessione indicia augmenti, quinta superueniet accessione declinationis principiū, quoniā videlicet status momētaneus extiterit, adeò vt nemo cū adesset agnouerit; sed vt exquisitè dignoscatur primū declinationis tēpus sit necessarium; quod etiā & in morborum augmentis sæpe euenire cōsuevit; nam prior aliquādo accessio principiū simul habuit, & ascensum, & vigorem. s. in prima sui parte principiū, deinde ascensum, postremo verò statum, deinceps secunda accessio manifestè videtur declinare; qua præsente qualis fuerit quæ præcessit, dignoscitur. Pari præterea ratione cū imbecilliora reddi videbis accidētia, cōtentionēmq; minui, paucis adhuc eā requirētib; succis, & iam statum finitū esse, declinationē verò aduētaffe cognoscas;

& maximè vrinis perfectissimè coctis apparentibus ; ac sputis pariter exquisitè coctis eductis, ac sine molestia, eorúmque copia diminuta, doloréque non amplius urgente, Et sic itaque vniuersalia morbi tempora, aut cum fiunt, aut nuper facta, in morbis percipere ex mox apparentibus poteris.

*Tempora adhuc futura, ex mox apparentibus quo modo præcognosci debeant. Cap. VII.*



**M**ORBORVM tempora vel cum dum fiunt, vel nuper facta, quo pacto tum ex accessionum incrementis, tum ex mox apparentibus cognoscantur, iam docuimus. Verùm cum generoso medico, haud præsentia tantum cognoscere sufficiat tēpora, quo etiam modo adhuc futura præcognoscere liceat, tū ex

ipſo morbo, tum ex anni tempore, tum etiam ex ipſis acceſſionibus, iam tradi-  
dimus. At cum, ſicuti diximus, ea quæ  
hactenus habita eſt eorum præcognitione  
coniecturalis ſit, & nō exquisita; ex eiſ-  
dem mox apparentibus eorundem futu-  
rorum præcognitionem, non artificio-  
ſæ tantum coniecturæ quidpiam haben-  
tem, ſed abſolutam atque ſcientificam,  
docere opportunū eſt. Quando omnis  
ratio tum præſagiendi, tum etiam cu-  
randi cogat, nihil tam eſſe ſtudioſè di-  
ſcendū, quā futuri ſtatus prænotionem,  
citra quam (vt infra clariuſ apparēbit)  
nihil certi de ægri futura morte, ſalutē  
ve pronuntiare poſſumus. Similiter num  
crifis futura ſit, & ſi ſit ventura, quan-  
do, & qualis erit, præſciri nequeat, ni  
ſtatus præſenſio habeatur; præterea nec  
recta vt victus ratione, ſine ea, poſſu-  
mus, vbi ipſa futuro morbi vigore præ-

scribatur. Quam ob rem maximum hoc est artis huius opus, & cæteris omnibus anteferendum, ipsius scilicet futuri status præcognitio, eadē ratione & principium & augmentum multo etiā antea quàm fiant præcognoscere præstat. Qua igitur ratione, cum nondum adsint vniuersalia tēpora, ex mox apparentibus præuideri possint, ipse Hypp. docet, inquiens in nostro aphorismo, si statim incipiente morbo apparuerint coctionis signa, breuem futurum morbum portendunt, cum enim cuiusq; nostri corporis, particulæ superfluitas, illam, quæ parti inest dispositionem ostendat, si reiectæ superfluitates exquisitè similes illis fuerint, quæ sanis aducnire solent, perfectissimæ coctæ apparebunt; integrāmque earum partium, quarum superfluitates extant, sanitatem attestantur, si verò aliquo modo impediantur, à naturalique recesserint habitu



habitu, tantū eas læsas esse demonstrant, quantum ipsæ à naturali declinauerint forma. Quam ab rem cum illi quod secundum naturam est, maximè contrarium crudum extet, iure fit, vt maximā patiētium membrorum imbecillitatem eraditatis denotent signa, coctionis verò indicia tantam adesse in dispositionē attestantur, quantum à signis perfectissimæ coctionis distant. Vnde & in primo vulgarium morborum dixit Hypp. coctiones ubiqz oportunas esse, & celeritatem iudicii, & securitatem sanitatis demonstrare. Verū licet ex mox apparentibus exquisitè futura præcognoscantur tempora; id tamen non semper prima vel secunda die assequi possumus, sed solummodo si morbus in primis quatuor diebus, vel in secundis decernetur, nos statim prima die exquisitè prævidere morbi statum poterimus. At si lon-

gior futurus sit morbus, non prima, aut secunda statim die, ( per diem autem notem quoque intelligimus adeo vt spatium viginti quatuor horarum sit ) exquisitè status præuideri potest; sed artificiosa tantum coniectura, si verò deinceps singulorum aduenientium quaternariorum signa diligēter considerabis, & ipsum quoque status tempus, exquisita assequi poteris præcognitione, vnde dicebat Hypp. oportet à prima die considerare, & in singulis adiectis quaternariis animaduertere, nec te latebit, quose morbus conuertetur. Et quanuis in morbis primum septenarium progressuris, futurus status prima die exquisitè nō præsciatur; id tamen haud multum refert; quando id cognitu in his morbis, nec admodum sit necessarium; cuius. n. gratia tali ægemus præcognitione, id iā habuimus, victus. s. formam congruam

constituere, cum status post multos dies sit subsecuturus . Quare si quarto vel quinto die status futurus sit, ac talē quis institueret victum, qualem, si die quadragesimo morbus esset finiturus, id maximum esset absurdum . Medicum igitur, qui prima, vel saltem secunda die, morbum primum septenarium pertransire non debere, non præcognouit, plurimum certè erraturum, sit verisimile . Qua autem ratione, id præuideatur ipse Hypp. docet, inquiens. Mitissimæ febres quæ cum signis securissimis fiunt, quarto die vel prius finiunt, atquæ malignitate excellunt, & cum signis grauissimis accidunt, quarto die occidūt, vel antea; Mitissimas itaque febres malignissimis opponens, neutras quartum transcendere diem, sed has quidem omnino solui, illas verò interficere, ostendit; si aliquis igitur acutè febriens primo statim die

nullum habeat periculosum signum, verum insuper omnia salutaria, vrinam autem mingat bene coloratam ac medicriter crassam, hunc medico artis operibus exercitato, in primis quatuor diebus à morbo liberum fore, in propatulo erit, & eo magis si nebula aliqua, vel suspensio optima ibi afforet, atque etiam tanto plus si bona adfuerit subsidientia. Sicuti verò acuta febris, quæ prima die omnia tutissima habet signa, in primo decretorium dierum periodo soluitur, sic quæ isti proxima adiacet, diem septimam non transcendet. Sed quænam hæc est, illa. scilicet cui non omnia statim prima die tutissima insunt signa, sed tuta solum, quare nec amplius mitissima, sed tantum mitis hæc ab ipso vocatur Hyppo. Vnde si primo statim die sit febris acuta, & non supremè, cum tutis signis, & non tutissimis, hæc ad secundum progredietur

quaternarium . Pari ratione maligna cum grauibus facta signis, quantū abest à malignissima & cū grauissimis signis inuadente , tanto mortem adfert tardior . Mites autem & mitissimas, & malignas & malignissimas quo mododistinquere oportet, alibi iam tradidimus ; sicuti quod tuta & tutissima , & grauia & grauissima signa, eandem uim non habent. Quod nisi prius sciueris, ac signorum vires distinxeris, ( sed potius hæc quidem bona, hæc verò mala simpliciter esse opinaberis ) tanquam vetulæ cātilenam , quæ ab Hypp. scripta sunt leges ; nullamque ex hoc libro percipies vtilitatem . Si verò hæc omnia diligenter contemplatus fueris , num morbus primo , vel secundo quaternario finiri debeat , prima vel saltem secunda die , præuidebis . Verū cum in morbis primo quaternario finituris , ma-

nifestæ coctionis signū prima statim die apparere sit necesse, iam in his morbis principium transgressum est; non. n. incepisse, est impossibile; fieri enim nequit, vt morbus aliquis proprium recipiat statum, non præcedente principio, & augmento. Extrême licet breue horū vtrunq; temporum fieri sæpius contingat, a deo vt in primo statim die (vt in peracutis accidit) multotiens ad statum perueniat morbus. Quorum quidem acutorum principiorum ac augmentorum, futuris finis præcognitionem inquirere non oportet, sed satis putare, si dum adsunt, cognosci possunt, vel cum quàm primū ad subsequens tempus conuertuntur; manifestè deprehendantur. Est autem communis talium principiorum, atque ascensum cognitio cum primis accessio nis partibus; idem enim & huius, & vniuersi morbi principium atque ascensus

est, nam neque ipsa statim incipit à statu, cum id ne cogitatione quidem assequi possit. Quinimo nec status ipse, cū prima inuadit die præsentione æget, sed cognitione solūm, quæ quo acquiratur modo superiori capite mōstrauimus. Cum itaque in morbis omnibus, qui primo septenario vel quanto vis citius fini-ri consueuerunt; uniuersam rationem tū cognoscendorum præsentium, tum præuidendorum futurorum vniuersalium tēporum, iā docuerimus. Ad eos qui vltra primam septimanam extendi debēt morbos, accedamus. In quibus & si primo die exquisita haberi non possit futurorum temporum præsentio, ea tamen artificiosa quadam coniectura, etiam à principio præcognoscere non interdicitur. Deinceps verò quo proximius accesserimus, singulorum aduenientium quaternariorum signis attendentes, ex-

quisitam quoque nanciscemur eorū  
præfensionem, secundum eam, quam  
nunc apperiemus rationem. Cum ita-  
que nō solum manifestæ coctionis signū  
non apparuerit, sed etiam cruditatis in-  
dicia adsunt, non tantū morbum in  
principio cōsistere exquisitè scimus, sed  
etiam ipsum prima septimana finem nō  
consequitur certò præuidemus. Quā-  
do qui primis septem diebus finiri mor-  
bus debet, manifestam vel debilem admi-  
nus coctionem prima die ostendat oportet.  
Verūm ad quantum tempus tum  
principium, tum reliqua protrahentur  
morbi tempora, primis diebus exquisitè  
præcognoscere non possumus, sed sola  
tantū artificiosa coniectura. Conie-  
iecturantes enim prima die, ad plurimos  
extendi debere dies principium, de reli-  
quorum quoque totius morbi temporū  
extensione suspicari licebit, proportio-



nantur enim adinuicem vniuersalia morbi tempora . Quam ob rem in morbis primam septimanam egredientibus , vt primis diebus futurũ principii finẽ præuideamus expedit, tũ ob se ipsum, tũ ob coniecturalẽ vniuersi morbi præsensio- nem. Futurũ aut principii finem præsentimus, præsentia cruditatis, vel occultæ coctionis signa, quantum à manifestæ coctionis signis distent contẽplantes. Totũ namq; tẽpus quod generationẽ manifestæ coctionis præcedere oportet , principio attribuendũ est. Quãtum verò adhuc præsentibus signis deficiat , ad illud manifestæ coctionis indicium, cognosces, ( si parum quidem desit exquisitẽ , si verò plurimum artificiosa tantũ coniectura ) primum quantum inuicem distent, ac superabundent, & cruditatis signa, & coctionis, considerans, ( nam & cruditatis signa non paruam inter se differe-

rentiam habent, adhuc autem magis et coctionis) deinde & morbi motum, & naturam, & tempus anni, & regionem; & ipsius laborantis temperiem, atque ætatem perpendens; Si itaque integræ cruditatis signa in primis quatuor diebus apparuerint, longum erit huic morbo principium; quod si morbus quoque suapte natura diuturnus fuerit, ut quotidiana febris, ac tardè in ea æger moueri videatur, ac quodammodo succendi & sufocari, & tempus anni hyems fuerit, & regio frigida, ætásque ac tēperies patientis ad frigidum quoque declinauerit, multo maiori opus erit tempore intermedio, ad hoc ut manifestæ coctionis signum generetur, quod totum tempus principio est condonandum; Adeo ut non modo neque intra septimum, sed neque etiam decima quarta die quispiā habere poterit, manifestæ coctionis si-

gnum . Si verò mediocris cruditatis notæ primis diebus conspiciantur, longum quidem & hoc erit principium, sed non priori simile . At si parua fuerint cruditatis signa, futurum & principii tempus paucum erit, adhuc autem brevius ubi occultæ vel imbecillæ coctionis visuntur notæ . Perpetuò tamen quibuscunq; apparentibus signis, nunc magis, nunc minus, erit aut diuturnum, aut breve, prout ea omnia quæ retulimus, morbi, inquã, naturam, motum, tempus anni, regionẽ, ægri temperaturam & ætatem, vel festinare, vel remorari coctiones, acciderit . His enim accelerantibus vel brevius, vel minus diuturnum, remorantibus verò vel longius vel minus breve morbi principium redditur . Hic præterea, & ea quoque quæ ab Hypp. longioris temporis significatiua dicuntur addere opportunum est, de quibus cum in sequen-

tibus plenior habendus sit sermo, nunc ex gratia huius tantum meminisse aphorismi sufficiat. Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem significāt, cum mitiori verò prolixitatem; nam si in primis diebus præualentibus adhuc crudelitatis signis, aliquæ huiusmodi notæ apparuerint, principii temporis addunt. Sic itaque primis diebus aliquam euenturi finis principii artificiosa coniectura præcognitionem habebimus, exquisitius autem, & magis certè ipsum præcognoscemus si superuenientibus quaternariis mentem adhibuerimus. Nam primus qui debilis coctionis signum ostendit; ipse manifestius reliquū principii indicabit, ( si vniuersum illud tempus, in quo nulum manifestæ coctionis signum cernitur, principium esse, pro comperto habueris ) ad hoc namque respiciens, non erit amplius difficile inuenire, si in tot

primis diebus, ab his quæ primo die apparuerunt, tot iã abscesserint, quot erũt reliqua transigenda, vsque ad manifestam coctionem. Et sic morbi præuidetur principium nunc quidem coniectura artis non experte, nunc verò exquisitius & certius. Pari ratione & reliqua tempora, ipsis primis quoque diebus hac poterimus præuidere coniectura. Si enim principium longum fore præcognoscimus, longius etiam & ascensus tempus erit, & status consimiliter post multum occurret tempus, sic & morbi solutio. Si verò breuius principium futurum præsenties; reliqua quoq; tempora breuiora fore artificiosa poteris suspicari coniectura. Exquisitius autem ipsa quoque præcognosces, si succedentes intueberis quaternarios singulos, eadem, quam in principii exquisita præcognitione docuimus, ratione, de qua cum etiam in-

ferius clarius agere oporteat( nunc hæc  
 sufficere, oppinantes ) Morborum iam  
 iam aggrediāmur mutationes vniuersa,  
 vt à principio proposuimus.

*Quid Crisis sit, & quo præsens evasura sit, digno-  
 scendi ratio. Cap. VIII:*



**I**TSI, nostrum in hoc libro  
 propositum fuerit, omnium  
 in morbis mutationum, præ  
 sentium quidem cognitionē,  
 futurarum verò præuidentiam, tradere;  
 vniuersalium nihilominus temporum tū  
 cognitionem, tum præsentionem prius  
 docuisse oportuit; quod cum hætenus  
 abundè perfecimus; ipsarum morbo-  
 rum mutationū, iam institutionē aggre-  
 diamur. Et cum multiplices huiusmodi  
 in morbis mutationes contingant, de sin-  
 gulis separatim tractare opportunū fue

rit. Sunt autem omnium in morbis mutationum sex differentiæ, vel enim subito ad sanitatem veniunt, vel subito interimunt, vel paulatim horum utrūq; contingit, vel mixtim, paulatim quidem, aut. s. morbo decrescente, vel ægri viribus succumbentibus; mixtim verò quando subita aliqua ad melius, vel peius cōmutatio facta fuerit, deinceps vsque ad omnimodam solutionem, vel mortem reliquum tempus fuerit absumptum.

Quarum omnium mutationum, cum prima, natura quæ præter naturam sunt superate, perficiatur, optima est, crisisq; per excellentiam appellatur. Ex permutationibus verò reliquis, quæ ad subitā terminatur mortē, mala nominatur crisis, quæ verò aliquam effatu dignā mutationem faciunt, non tamen integram solutionem vel mortē, imperfectæ crises vocantur, sicuti quæ sensim emorien

te vel virtute, vel morbo accidunt, simpliciter solutiones dicuntur, & non crises. Crisis autem nomē inde ortum putandum est; quod cum plurimis ac vehementibus accidentibus tum præcedentibus, tum concomitantibus, vnde nō parvus inspicientes inuadat timor, cum quispiam vulgaris homo istis adesset (re ipsa cogente) ita pronunciauerit, tunc de ægrotantis vita iudicium agi; neque. n. medicorum aliquis primus id nomen inuenit, cum generosum medicum neque turbari, neq; futurum euentum ignorare deceat, omnino enim fuit necessarium vt qui præsens esset cōturbaretur, atq; ideo exclamaret, & crisim idest iudicium rem ipsam nominaret; quod deinceps nomē à medicis quoq; receptum est, quærentibus potius quo pacto ipsa præcognoscatur, quàm quo vocetur nomine; quando quoquomodo appelletur dummodo  
rem



rem ipsam intelligas, minime curand  
impedies rationem. At cum ea quæ te  
nemus, alios docere non liceat, ni pro re  
bus ipsis nominibus utamur; ne nos inu-  
tiles nominum disceptatio interturbet,  
hæc in primis præfari operæpretium du-  
ximus; Quibus sic præmissis, de omniū  
prima, quam optimā esse, & crīsim sim-  
pliciter uocari mōstrauimus, agamus pri-  
mū, deinceps verò & de reliquis. Cri-  
sis itaq; simpliciter vocata, est subita ad  
sanitatem conuersio, quibusdam subitis  
excretionibus, aut effatu dignis abscessi-  
bus factā, ( quicunq; enim absq; ratione  
quicuerint, malignius retrocedunt ) an-  
tecedentēque huiusmodi excretiones,  
& abscessus, non mediocri in corpore æ-  
grotantis perturbatio. Vnde & an-  
xietates, & vigiliæ, & demētia, & graues  
somnia, & difficiles anhelitus, & allucina-  
tiones, vertigines, difficiles sensus, capi-

tis, colli, stomachi, & multorum aliorum membrorum dolores, nonnullis verò aurium sonitus, & vanæ ante oculos apparent imagines, & lachrimæ inuoluntariæ efflunt, & vrina retinetur, & labrū agitatur, aut aliquid tremulum fit; Obliuio, & præfentiū ignorātia, & vehemens accidit rigor; & plurimum accessio confuetam anticipat horam, & multus æstus fitisque intollerabilis fequitur, clamant, & salunt ficuti furentes, neq; in eodem fitu possunt recumbere; deinde repente multus sudor erumpit, aut vomitus aliquis non paucus insequitur, aut venter subitò soluitur, aut abundans fit fluxus sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt. Quam ob rem & quo præfens crisis fit euasura, dignoscere, & quæ adhuc futura est, præuidere oportet. Et licet cognitio de præfentis crisis euentu, nō multum distet à præcognitione eiusdem fu-

turæ, ex ea dem. n. contemplatione vtraque perficitur, melius nihilominus erit, prius de præsentis euentu agere, deinde verò de futura. Primū igitur & maximū instantis bonæ crisis indicium, coctiones sunt, siquidem milles dum crises fiunt aderis, neminem vnquam intereuntem videbis, qui præcedentibus perfectis coctionibus crisim patiatur. Verū cum & vrina, & sputum, & alui excremēta coctionis indicia sint; non tamen æqua omnium horum signorum dignitas est estimanda. Sed in morbis quidem thoracis ac pulmonum præcipue sputa sunt animaduertenda, non tamen vrinarū cōtemplatio negligenda; quinimo excrementa quoq; alui inspicio. Si verò tantūm febricitēt sine alicuius visceris passione, vel epatis, splenis, renum, vel vesicæ inflammatione, maximè vrinis animum adhibere oportet; sicuti si circa ventriculum

passio sit, primùm alui excrementa contemplato, deinde neque vrinas negligito. Semper autem cum febris aderit, siue ex sola humorum putredine accensa sit, siue ex membro inflammationem patiente, præcipuè vrinas inspiciendas censeo; Atque inde coctiones cognoscēdas. Secundum autem bonæ instantis crisis signum est; quod in aliqua critica die fiat, ac à die indicatoria ( cui anexa sit diei indicantis potentia ) antea indicetur. Deinceps verò & morbi morem, & speciem, inspicere oportet. Mos enim si mitis ac moderatus extiterit, bonam fore crisin sperabimus. Si verò prauus atque malignus, non bonam suspicabimur; Speciem intuebimur, num formæ morbi excretio respondeat, perpendiculariter. Vrgente nanque ardente febre, vel sanguis è naribus profluet, vel post vehementem rigorem sudor

multus, & calidus per totum emanabit corpus; aut per vomitum, aut per aluum, aliquod biliosum excernetur; Ita & tertiana vomitibus, & excrementis biliosis, & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet; Plurimum autem pituitæ in quotidianis febribus excernitur, & multi in toto corpore sudores fiunt; Finit autem & phrenitum sudor multus, & præcipuè si ex capite multus & calidus fluxerit, sudante simul reliquo corpore; Cōtingit aliquando etiam per sanguinem è naribus fluentem phrenitidem finiri.

Non tamen letargus aut peripneumonia fluxum sanguinis amant; Inter ipsas autem pleuritis medium obtinet locum, minus enim quàm febris ardens & phrenitis, magis autem quàm peripneumonia, atque letargus, profluvio sanguinis soluitur. Soluit etiam lienis & hepatis inflammationes sanguis è,

naribus profluens , cum hæc viscera vnà cum acutis febribus habent inflammationes . Et omnes quæ sub præcordiis fiunt calidæ atque acutæ inflammationes, fluxu sanguinis finiuntur ; oportet autẽ per directum sanguinem fluere ; ex dextra quidem nare , hepate partiẽte, vel locis sub dextris præcordiis positis, ex sinistra autem liene & locis vicinis . Iuuat autẽ sudor bonus omnes quæ iuxta præcordia sunt inflammationes calidas & acutas . Hepatis verò conuexæ partes patientes, tribus præcipue modis crisis obediunt, fluxibus sanguinis ex dextra nare, & sudoribus bonis, & vrinis abundantibus, cauæ autem partes , biliosis excrementis, atque sudoribus, nonnunquam verò & vomitibus ; Magis autem per urinas expurgari postulant, quàm conuexæ hepatis partes, omnia ea , quæ vel in partibus renum vel visicæ labo-

rant. Sicuti loca ad thoracem pertinentia sputis ex pulmone. Sudores verò omnibus febribus proprii sunt, & præcipuè ardentibus. Iuuant autem non parum & efferuentes inflammationes, quando, sicuti antea diximus, vnà cum coctionibus emanauerint. Finiunt etiam & quotidianas febres, simul vomitibus, atque excrementis pituitosis adiunctis; & quartanas quoque, si atra simul ac varia excernantur. Semitertianas verò, si biliosa simul & pituitosa. Finiunt quoque parotides, letargos, & reliquos omnes capitis affectus. Aliique decubitus, omnes diuturnas febres securè finire consueverunt. Sed nondum de diuturnis morbis dicere proposuimus. Nam repentinæ mutationes a cutorum sunt, quarum optimam, qualis sit, nunc narramus; quæ videlicet sine coctione perfecta non est, & quæ in aliquo die iudicatorio fit, ac

præterea ab aliquo indicatorio antea indicata, & crisis motum morbo conuenientem obtinens, secundũ paulo ante recensitam rationem. Præter hæc autem hortor vt etiam ægrotantis ætatem, ac naturam, nec non ante actum victum, regionem, anni tempus, ac præsentis temporis statum, cõsideres; Si enim quemadmodum morbus fortè biliosus est, hæc etiam singula æquè biliosa sint, oportet bilem crisi expurgari, Sicuti si pituita superabundauerit, ea vacuari debet; Variis verò superfluentibus humoribus variam oportet esse cuacuationem. Cum autem hæc vniuersa bene tibi fuerint explorata, iam instantis crisis cognoscere cumentum; At quo adhuc certior, huiusmodi reddatur cognitio, iam cuentus ipsi sunt contẽplandi. Si enim ægrotante crissim passo, febris soluatur, atq; ab aliis accidentibus liberetur, & melius fuerit



coloratus, pro ratione euacuationis, cū melioribus pulsibus, & ad surgēdum robustior, hæc optima crisis est; Si verò ex his aliquid desit, tantū ab optima deficit, quāta est eius quod deest vis; Et sic quidem vrgentis crisis euentum dignoscere oportet, futuram verò quo præuidere valeamus iam mōstrare aggrediamur.

*Optimæ Crisis, futuræ adhuc, præcognescendī  
ratio. Cap. IX.*



V T V R A E crisis præcognitio non multū distat à præmostrata instantis crisis, euentus cognitione; Cum ex eadem contemplatione vtrāque perficiatur. In hoc tamen differunt, quòd de præsente, num bona sit solūm quærimus cognoscere. De futura verò primūm num

fiet, ſecundo num ſi fiet, erit bona, tertio quo fiet tempore, & quarto quo eueniet modo, præuidere operæpretium eſt. Quæ omnia ex ſpecie, ex vehementia, ex more, ac ex motu ipſius morbi maximè præcognoſcuntur, nec non ex conſideratione temporis anni, regionis, & aliorum, quæ cuiusdem ſunt ordinis, ac etiam ex accidentibus, quæ vnà cū crifi ab initio inuadunt, vel paululum anticipant, quæ propriè critica nominantur. Verùm cū non vniuerſa hæc, eorū vnū quodqꝫ, vel ſimul cuncta indeterminatè indicēt, ſed certa tantùm ac diſtincta ratione, ex ipſorum his vel illis, hoc vel illud, præuideamus; Hanc nos docere rationem operæpretium eſt; Num itaque morbus per crifim finire, vel per ſimplicē ſolutionem ſolui debeat; ex ipſa morbi ſpecie, atque magnitudine præuidetur; Siquidem a cutorum tantūmodo morborū crifes fiunt,

diuturni verò morbi simpliciter solui cō  
fueuerunt. At cum nec omnes acuti mor  
bi crīsim patiantur, quando eorū quoqꝫ  
aliqui simplicem inire conspiciantur so  
lutionem; num consequutura sit crīsis, ex  
morbi contemplari oportet magnitudi  
ne. Si quidem magni iudicantur omnino,  
parui verò soluuntur solūm. Manifestio  
ris igitur doctrinæ gratia, ducatur ad ex  
emplum ægrotus ardente febre corre  
ptus; hunc crīsim passurum, tū ex mor  
bi specie, tum etiā ex magnitudine præ  
uidebimus, quod si regio, tempus anni,  
ætas, & temperies ægri, & consimilia, ad  
calidum vergentia, morbi acuitati con  
sentiant, adhuc certius crīsim expectare  
conuenit. Vtrum verò optima, malāue,  
futura sit crīsis, tum ægroti virium ro  
bur, tum etiam morem inspiciendo præ  
senties. Vnde si ardens, quam proposui  
mus febrem, benigna sit; quod ex salu-

bribus depræhenditur signis ( quæ autem hæc sint alibi docuimus ) optimam sperare debemus futuram crisim . Magisque, si id quoque validæ ægrotantiũ vires, atestentur; Sed num vires futuram optimam crisim arguant, impediánt ue, cognosces, ipsarum robur, morbi magnitudinem, ac futurum statum contemplando; sine quorum trium cognitione, nihil de futura salute inuestigare contingit; Sicuti nec nunquid aliquis portando oneri sufficiet, scire possumus, hominis robore, oneris magnitudine, & viæ longitudine antea non perspecta. Aegri namque vires portanti onus, morbi verò magnitudo oneri, tempus autem quod usq; ad statum extenditur, longitudini viæ respondet. Quamobrem quæ ardens præposita est febris, cum acutus ac magnus morbus sit, futuram indicat crisim, cum verò salubris quoque, siue benigna.

extet, futuram crīsim optimam etiam fore præmonet. Verū cum optima crīsis in ipso statu, vt infra mōstrabimus, semper fiat, status verò nunc citius, nunc verò tardius multo in morbis contingat, viresque non in omnibus, ac semper, æquali reperiantur robore; si in propōita febre vires poterint validæ usque ad status tempus seruari, optima sequetur crīsis, integrēq; liberabitur æger; At si ante statum, vires ob ipsarum imbecillitatem succumbant, non solum optima non fiet crīsis, sed æger morietur. (quantumvis morbo ex sui natura salubri existente) quando tunc primū ægrotantē mori sit necessarium, vbi vires morbo succubuerint. Crīsis autem post quantum tempus expectanda sit, vniuersalium tēporum præcognitio, ac futuri præcipuè status, docebit; cū nanq; optimā crīsim, ante perfectam coctionē fieri non posse.

dixerimus, nec exquisitam coctionē ante ipsum statum, status tempore optimā aduenire crisim necessarium est; Quapropter si præfatus æger statim prima die manifestissima habuerit coctionis signa, in primo omnino quaternario morbum scimus finitum per crisim. Certa verò crisis dies ex ipso morbi motu præuidebitur. Nam cum qui in primo quaternario crisim habiturus morbus est, peracutus sit oporteat, vel febris erit synochus, vel continua, quæ per tertium exacerbatur. At si synochus quarta die crisim expectabis, natura à propriis circuitibus ad crisim perueniente, si verò continua fuerit, cum in idem tempus crisim incidere oporteat, cum acesione, vel in tertia die vel in quinta crisim fieri cōuenit. Et hinc raro accidit ut die quarta fiat crisis, a deo ut bis tantum toto tempore vitæ suæ id obseruasse videatur Ar

chigenes , ego verò ad hanc vsque horam semel solùm . Nam synochi raro eueniūt , & præsertim quod nullus comitatur error , huiusmodi enim semper meminisse oportet . In continuis verò sæpius ex quarto die ad quintum , vel tertium crisis transmutetur ; quinimo si etiã quandoque quarto die iudicentur , ratione eius accesssionis , quæ tertio die fit , id patiuntur ; quæ enim circa horam vnde cĩmam , ( si ita contigerit ) dici tertii accessio inuadit , vel tertia nocte , vel quarto die crĩsim inuehit . Verũm num die tertio vel quinto futura sit , morbi motus præmostrat , si velox enim motus sit , in tertio iudicabitur ; in quinto verò si non adeo celeriter moueatur . Cum itaque prima die signum aliquod coctiõnis manifestum apparuerit , reliquis etiã omnibus nullum periculum protendentibus ; tunc proculdubio scis , quod mor

bus primo quaternario salubriter necessariò soluetur; quòd si eius quoque magnitudo inspecta fuerit, etiam quòd crisi finietur præuidebis. Ex morbi verò motu quòd tertio vel quarto, vel quinto fiet, præsenties. Siquidem celer motus sit, tertio, si verò quodammodo tardior, quinto, at si febris synochus fuerit, in quarto. Aduuat verò motus celeritatem, morbi magnitudo, & anni tempus & regio & ætas & quæcunque alia amaræ bili conueniunt. Tarditati verò motus insunt contraria. Subiciatur rursus alius æger qui nullum habeat coctionis signum manifestum, nec in primo, nec in secundo die, nec tamen perniciosum, sed omnino omnia sint absque periculo, saluabitur quidem & hic, sed in primo quaternario integrè non liberabitur, oportet autem diligenter mentem adhibere, nunquid aliquod signum manifestæ coctionis

nis



nis in quarta appareat die. Nam si hoc fiet, necesse est vt die septima æger liberetur, modò interim nullus admittatur error. Si verò salus per crisim sit futura, vel sine crisi, ex morbi noscitur magnitudine; Liquet enim quòd si magnus fuerit, omnino per crisim finietur morbus, quòd si etiã motus adsit velocitas, multo magis id fiet; quòd si aliquis error circa ægrum cõmittatur, nõ magnus tamen, nihilominus sperandum crisim die septimo euẽturam; Si verò non multùm velociter moueatur, & aliquis interim error contingat, ad nonũ diem crisis transferetur; Rursus itaque supponamus aliquem salubri morbo laborare, qui die quinta aliquod coctionis manifestæ signũ habeat, hic si morbus magnus extiterit & celeriter moueatur, vndecimo potius quã die decimo quarto crisim patietur, quòd si non adeò magnus nec ita

cclerem habuerit motum, decimo quarto magis quàm vndecimo; Simul verò cum aliis est distinguendum, si & iuuenis fuerit, & natura biliosus, & tempus æstiuum, & in loco calido ægrotauerit, & prior victus & quæcunque præsentī attinēt statui ad calorē declinauerint. Nam tūc omnino iste die vndecimo crīsim patietur; Quemadmodum si omnia contraria iis, quæ dicta sunt, affuerint ægrotanti, in quarto decimo; quòd si nonnulla quidem aderint, nonnulla verò non, atq; interim aliquis accadat error, fieri nequit vt crīsis die vndecimo sequatur, quinimo nec etiā aliquando die decimo quarto, vbi scilicet magis erratum fuerit; Sed si nullo errore cōtingente, mixta fuerint accidentia, hic medico opus erit exercitato, ac perspicaci, vt ea quæ maiorem vim habent signa, distinguat, & illi quæ ab ipsis ostenditur crīsi, fidem adhibeat

certiorem, in hisce adeò ambiguis præcognitionibus ; si nanque neque in ipso septimo die, quod futurum est, exquisitè præuidere licebit; in aliis tamē inter septimum & vndecimum existentibus diebus, id certè præcognoscemus ; Nam si magnitudo & velocitas motus morbi, in eisdem diebus intendatur, ac coctionis signis effatu digna accessio facta fuerit, huiusmodi ægrotus die vndecimo crisim obtinebit; Sicuti si contra se habuerint, in quarto decimo; Subiciatur iterum ægrotus qui in morbo salubri in primis diebus (per primos autem dies, quaternarium primum intelligimus) tardiores febris motum habeat, neque cum nimis vehementi calore, veruntamen cruditatis adsint signa ; quòd quidem intra quartum decimum diem hic non liberabitur morbo, iam manifestum est; Si verò in illa ipsa die, vel postea, ex morbi tempo-

ribus distinguendum est; nam principii quidem signa, si diu permanserint, diuturnum morbum fore significatur; Augmenti verò si in quarta vel septima die apparuerint, sperandum est aliquod in quarto decimo, sed in vndecimo determinabitur; Nam si hæc tria in eo die cōiuncta fuerint, & motus velocitas quæ sufficiens sumpserit incrementum, & febris magnitudo, ac præterea manifestius coctionis indicium, fiet crisis in quarta decima; adhuc autem magis, si & anni tēpus, & ætas ægrotantis, ac temperies, & quæcumque alia his sunt proportionalia, ad crisim celeritatem cōtulerint; Si verò solum coctionis signum manifestum die vndecimo appareat, nec tamen morbi magnitudo, ac motus velocitas festinauerint, tunc ultra decimum quartum diem crisis differetur; Sed si quidem anni tempus & ætas & cōsimilia ad frigidius de-

clinauerint, fortè sperandum est morbi solutionem vigesimo die sequuturā; At si mixta signa fuerint, & dies decimus quartus coctionē insigniter auxerit, die decimo septimo crisis occurret; Si verò neq3 die quarto decimo aliquid nouatū fuerit quod sit valde exquisitū, tunc ad diem decimū septimum est respiciendum, si. n. in eo aliquid signum apparuerit, id fidissimum erit, quanuis valde exiguum fuerit, vigesimoq3 die crisin futurā præmōstrabit. Et sic quidem omnes optimæ crises, quæ die vigesimo fiunt, vel citius, præuidentur, eademq3 ratione reliquas omnes optimas post vigesimā diē contingentes, poterimus præcognoscere, in singulis superuenientibus quater rariis, tum morbi magnitudinem, tum motus celeritatem, tum ipsa coctionis signa contemplantes. Quæ omnia si eodem quaternario manifestè increuerint

in subsequenti crisis fiet, & maximè si alia omnia, vel plurima, potiora ue, eorum quæ vnà perpendenda esse diximus, crisis accelerent aduentum. Cum itaque hætenus, optimarum cresium quælibet, num futura sit, & quo tempore, nec non qua die aduenire debeat, præcognoscendi docuerimus rationem; quo etiam modo, siue qua excretionis, abscessusue, specie, continget, præsentionem inquirere oportet, quando quælibet earum eadē excretionis forma, eodem abscessu non eueniat.

*futura Crisis modum quo pacto prævidere oportet. Cap. X.*



**Q**VALIS Crisis erit, hoc est vtrum per sanguinis fluxum vel sudores, vel vomitū, vel deiectionem, vel abscessum

quempiam, vel aliquod huiusmodi, iam  
explanare conuenit. Hic quoque ab  
Hypp. bonarum omnium disciplinarum  
duce ac auctore exordientes; qui in pri  
mo vulgarium morborum libro, & in li  
bris præfagiorum, omnia futurum cri  
sis modum præmōstrantia indicia breui  
ter docuit; Et quanuis nullum futuræ  
crisis modi indicium ab ipso prætermi  
tatur (pulsibus dēptis) nihilominus mul  
ti priscam breuitatem aduertere haud  
consueti, plurima deficere crediderunt.  
Quam ob rem manifestius nos altero ser  
mone de illis eisdem agere operæpretiū  
est; fortè enim hoc modo discentes, neq3  
modū futuræ crisis præcognoscere im  
possibile esse arbitrabuntur, neq3 circa  
exercitationem torpebunt. Duplex ita  
que cum sit, modorum futuræ crisis pri  
mum genus, (vel. n. per excretionem, vel  
per abscessum fit) quare nunc vno, nunc

verò altero, horum generum modo crisis contingat, primū scire oportet; deinceps verò vniuscuiusque modi particula tim notæ sunt indagandæ; Cum igitur morbi à calidioribus humoribus geniti, ægri viribus validis existētibus per excretionem iudicentur. His contrariæ sunt affectiones, in quibus facultas imbecillis est, & humor frigidus, quæ nec excretionem, nec abscessu iudicantur; Sed aut ægrū corrumpunt, aut perquàm longo tempore vix concoquuntur. Inter has autem mediæ intercidunt, quæ per abscessum finiuntur; in quibus ex duabus dictis oppositionibus alterum ex altera, & alterum ex reliqua est; Duæ enim oppositiones existunt, è quibus altera secundum naturam humorum, altera secundum vires habetur; Atq; in alterutra earum duo inter se opponuntur, ex humoribus quidem calidi frigidis, ex viribus ve-



rò valentes debilioribus. Si igitur humores calidi sint non oportet facultatem robustam haberi, si abscessus quispian futurus est; Si verò frigidi, facultate opus est valida, ad abscessum; Quam obrem, cum crisin futuram esse ex his quæ diximus; præcognitum sit, deinceps qualis futura sit, hoc pacto distinguentes præuidebimus; Acuto namq; & calido morbo existente, si crisis primis periodis fiet, necesse est in talibus crisisbus non abscessum, sed excretionem subsequi. Cum virium robur primis periodis semper adesse consueuerit, quinimo & in subsequenteribus quoque morbo bilioso perseverante, ac virium robore non confractione excretionem expectare debemus; Si imbecilles verò vires fuerint morbo quavis calido existente, abscessum potius quàm excretionem suspicari conuenit.

Vallidior enim facultas ad excretionem quàm ad abscessum requiritur. At si frigidus & tardus morbus sit, per abscessum quiescere consuevit, virtute valida existēte. Nisi enim viriū robur adsit, nec excretio nec abscessus tali superuenit morbo. His sic præfinitis dein considerandum est, siquidem per excretionem terminari debet, num quid profluuium sanguinis, vel vomitus, vel sudor, vel alui subductio sequetur; Si verò per abscessum, quod membrorum, & quis articulus abscessum suscipiet; Ad id autem nil magis generatim confert, quàm naturæ inclinationem contemplari. Vnde Hypocrates de peripneumonia in pronosticis loquens aiebat, coniectare autē oportet in his naturæ motum, speciatim verò in his qui per excretionem terminari debent, dupliciter distinguere oportet, tū. s. futuræ excretionis signis, si affuerint,

tum aliorum si non adsint ; certius enim sperabis cum, qui semper præostenditur, modum excretionis, si nullū te aliud distraxerit ; quapropter propria vniuscuiusque excretionis indicia me referre conuenit, te verò in ægrotantibus non hæc sola inspicere, sed & singula alia considerare oportet ; Si itaque præter rationem alius & vrina comprimatur, iam prope crisi existente, rigorem sperare debemus ; & quanto exquisitius ardens febris fuerit, tanto certior rigoris erit præcognitio ; Quod enim incendit biliosum est ; bilis verò vbi vehementius mouetur rigorem excitat. Quod si & nox difficilis antecesserit, & dies indicatorius sit, certius futurus rigor prædicti poterit ; At si nota ex arteriæ pulsatu ( vt didicisti ) idem tibi ostenderit, non rigorem solū verū etiam acerbissimum rigorem indubitanter fore expec-

ſtato. At cum rigor contigerit, diſtinguendum erit, num ſudor poſt ipſum ſequetur, vel vomitus, vel ventris ſubduſſio, vel horū aliqua, vel omnia; Hoc autem diſtinguemus, num vrina tantum reſtenta, vel aluo etiam ſupreſſa, rigor ſuperuenerit, cōtemplantes; Ambobus. n. ſupreſſis, neceſſariò multus ſubſequetur rigor & ſudor; Redundantis nanq; ſeroſæ humiditatis triplicem eſſe didiciſtis euacuationem, per aluum, per lotium, & per ſudores; Si ſola verò vrina comprimatur, conſiderare cōuenit, nunquid alui excrementa plura quàm priora, vel pauciora ante criſim extiterint; Si nanq; multa, manifeſtius naturæ motus ad hunc locum eſt agnoſcendus; Vnde ſupreſſæ vrinæ ad futurum rigorem præſentiendum fidere non conuenit; Si verò pauciora, ægrum rigere ſudaréq; neceſſe eſt; At ſi vomitus quoque notæ

aderint, per has ambas crises iudicabitur, & vel magis per earū alteram, quæ magis præualebit, vel æquè per vtrāque, quando æqualia quodammodo indicia extiterint; Si verò vomitus signa non affuerint, solos sudores expectare operæpretium est; & maxime quando ægroti delirauerint in crescente acesione, & partes externæ calidiores, ac rubidiores apparuerint, & vapor quidam calidus exierit, qualis antea non aderat; Quòd si pulsus vndosus fiat, & insigniter mollis, adhuc amplius sudores erunt expectandi; Durus autem pulsus vomitus magis, quàm sudores præostendere solet; Altus autem pulsus, omnis excretionis indicium est, sicuti & vehemens, Magnus verò si pulsus fuerit, motus ad exteriora potius quàm ad interna signum extat; Cum verò vtrumque duplex sit, hic quidem,

ad externa, per fluxum sanguinis narium, atque per sudores, alter autem interius per aluum, & sthomacum; Vndo fus quidem pulsus sudores; magnus autem simpliciter sanguinis fluxum præmonstrat; motu verò ad interna superante; cum non aderunt signa vomitus, per ventris excremèta crisis fiet, si verò aderint per vomitum potius. At si ipsis præsentibus, venter insigniter subducatur; per vtraque crisis fiet; Inæqualis quoque pulsus aliquando in crisis fit; & præcipuè cum non fiant sine periculo et pugna, & multo etiam magis cum bilio si humores ad ventriculum confluunt; Grauito enim, vel morsum patiente stomacho, omnino inæquales tunc pulsus efficiuntur. Vomituum autem signa sunt oris ventriculi morsus, simul cum capitis dolore, & vertigines obortæ, cum his quæ obiciuntur oculis, tenebrosis, & cū

agitatione labri inferioris, & multo ac tenui sputo defluente. Quæ omnia, bilioso ac mordaci humore in ventriculo collecto, accidere consueverunt; cum eo ventriculi os (ob magnitudinem nervorum sentientium) mordeatur; ac ab eodem plenius calefacto, nec non (vt ita dicam) vehementer affato, atra exhalatio, ac ceu fuligo quædam capiti transmittatur, ob quam capitis infestat dolor; ac etiam quantum eius ad oculos permeat, turbulentior in eis humorem natura splendidum ac purum reddit, quam exhalationem uisorius spiritus ad oculos à cerebro permeans sentiens quoque, quemadmodum per suffusiones, visa tenebrosa committit. Ab eadem verò bile interna ventriculi tunica commorsa, infernum labrum contremiscere, ac commoueri contingit. Didicimus enim ex dissectione vnā est

se vniuersam hanc tunicam perpetuam per omnia sibi, & omnis ventriculi, & gulæ, & linguæ, & palati, & omnis oris. Hæc igitur est, quæ morfa à bili in ore ventriculi contenta, infernum labrum commouet; Quæ quidem bilis, præ leuitate sua fluitare consueta, ventriculi fundum derelinquens, ac ad gulam vergens, facile uomi solet; Quod si vt antea diximus rigor inuasit, & partes quæ sunt infra præcordia frigida fuerint, celerius non solum adhuc aderit vomitus, sed etiam bilis erit copiosior; Quin etiam si quid esitet, aut bibat, per illud tempus æger, citius adhuc euomet, cum vnà cum bili, ingesta cibaria in ventriculo videntur; Si præter hæc autem, pulsus durus appareat; ac morbi species, & ætas & temperies ægri, & regio, & tempus anni, & consimilia bili correspondeant, certius non solum vomitum, sed biliosum quoque



que ipsum fore coniicere oportet ; Sanguinis autem profluvii propria indicia sunt , quidam fulgoris motus oculis apparentes , quoniam humor flavus est ; & obtusiones , quoniam multus & totus simul elatus ad superna , spiritus meatus obscurat ; Ita etiam & oculi lacrimant , ob fluxus multitudinem ; Quod in inflammationibus quoque oculorum accidit ; Eadem ratione rubidi aliquando videntur , cum malis nonnunquam , & naribus . Proprium etiam sanguinis fluxus è naribus est , præcordiorum tensio sine dolore ; Non paruum enim hoc sanguinis ad superiara tendentis indicium est ; Sicuti & difficultas anhelitus , nam & hæc sanguine per thoracē transeunte fit ; Cum itaq; præcordiorum tensio sine dolore , impetus humorum in caput , signum sit , non ab re capitis calore sanguinem sursum attrahente , ac iccore impellente , sangui

nis est expectanda rüptio ; Si verò cū dolore præcordia tendantur, non fluxū sanguinis, sed aliquam ibi adesse inflammationem significant; Licet viscerū quoque sub præcordiis existentium inflammationes & causæ & signa sanguinis fluxus sint, quando morbus per excretionē terminari debeat; Sed & capitis dolores fluxurum sanguinem indicant, quanuis vomitū quoque indicia existāt; Qui enim velut mordaces sentiuntur, vomituum sunt indicia. At qui quodammodo graues, atque extendentes, pulsantésque & calidi apparent, sanguinis fluxuri sunt signa; & maximè si pulsus magni fuerint. Præter hæc autē omnia & morbus, & ætas, ac temperamentum ægroti, & præsens constitutio, & huiusmodi, sanguinis profluuium indicare possunt; Quòd si sanguinem quoque ex eodem latere saluberrimè, ex opposito verò nō sine no-

xa fluere sciuerimus, vti & Hypp. docet, & experientia comprobat; Narem etiā ex qua fluxurus sanguis est, facillimum erit prædicere; cum affectum locum exquisitè dignoscere possis, & crisis morē non ignores, & signa fluxurum sanguinē indicantia sint euidenter manifesta; Sanguinis itaque fluxus, & vomitus propria & manifesta sunt signa, post hæc verò & sudorum; Si verò per alui excrementa crisis sit subsecutura, manifestum quidem nullum est signum, nec proprium, sed ex eo quòd adsunt crisis signa, desunt verò vomituū, & fluxus sanguinis, & sudorum, colligere licet; Quamquam nullo etiam horum signorum apparente, solūm per alui deiectionem omnino crisis non est expectanda. Cum & per hemorrhoidas, & in mulieribus per menses huiusmodi euenire crisis possit; Verūm nec id omnino impossibile est distingue-

per excretionem iudicetur. Verùm cum morborum ab huiusmodi crudis ac crassis succis genitorum, quidam exitiosi sint, quidam verò mites; Qui abscessu finiri debet morbus, in horum medio consistere necesse est; Exitialibus namque nullus vnquam bonus superuenire potest abscessus; Mitis verò ac placidior, & si ex crasso ac crudo oriatur humore, cum coctione solui possit, ad abscessum non conuertitur. Vnde solùm qui inter eos medius extat morbus, per abscessum iudicabitur; Est autem horum medius, qui nec perniciosi moris est, nec modico negotio concoquitur. Quamobrem si in aliquo dictorum morborum vrina multa, crassa, ac multam habens subsidentiam conspiciatur, morbum potius per coctionem solutum iri, quàm per abscessum iudicandum fore, coniciendũ est. Tenui verò ac

cruda perseverante, si cætera ut in conualituris indicia fuerint, abscessum expectare conuenit; idq; magis ac citius in iunioribus nōdum treginta annos natis, natu verò maioribus, nondum tamē senibus, minus eueniunt ac longiore tempore, senibus autem nullo accidunt modo; Nam in morbis per abscessum iudicandis facultatem validam, & non prorsus imbecillam (cuiusmodi senū est) esse oportet; Simili modo nec in omni febre, at in continua tantū talis expectandus est abscessus; Intermitens. n. in quartanā potius quā in abscessum finitur; & maximē si erraticæ more inuaserit, atque autumno appropinquauerit; Pariter hyeme etiam magis abscessus fieri contingit, ob frigidorum humorum exuperantiam, quo quoque tempore tardius desinunt, tum ob nimiam humorum crassitiem, tum etiam ob immodicam ambi

entis nos aëris frigiditatē, minusq; tunc temporis retrocedunt, quando quidem repetentibus, motionem quandam a se se necesse sit, frigidi verò moueri ægrius possint; Et sic communiter futurum præuidemus abscessum; Quòd verò mēbrum, aut quem articulum obsidebit, morbi naturam exquisitè intuentes, præsentiemus. Nam si morbus per abscessum iudicāndus, minus diuturnus ac acutus magis extiterit, cum in ipso crassi minus sint humores, ac maior caloris copia, nec non valentior facultas, in superius partibus erupturum abscessum suspicari cōuenit. Quòd si in huiusmodi morbo, repente ac sine euidenti causa anhelitus superuenerit difficultas, moxque quieuerit, adhuc certius humores fursū ferri coniicito, & si præter difficilem hanc respirationem, capitis grauitas ac dolor subsequatur, & grauis somnus,

nec non repentina surditas, non solum in superioribus partibus euenturum abscessum præcognoscemus, sed etiã glandosas post aures carnes, ipsum necessario obfessurum prædicemus. Si morbus verò admodum diuturnus sit, ob frigus ac humorum crassitiem, nec non ob virium longo temporis interuallo languētium imbecillitatem, ad infernas sedes abscessus erumpent; & maximè vbi prædictorum signorum nullum adfuerit, & in ægroto ex locis infernis vel grauitas, vel tensio, vel inflammatio, vel dolor apparuerit. At morbi medii, inter hos obtinent abscessus; qui medio genere ambigunt; neque conuenit, quantum in ipsum agitur tempus, quærere sint ne sursum potius quàm deorsum erupturi, sed ex aliis diffiniri signis oportet; Et sic itaque non solum, num crisis futura sit, & si sit, num bona, & quo tempore, præuidere

licebit, vt in superiori diximus capite, sed etiam futurum ipsarum crisiū modum tum generatim tum particulatim præsenti-  
sentire poterimus, vt in præsenti docui-  
mus capite. Quibus absolutis ad reli-  
qua, quæ in crisi-  
bus tractanda supersunt  
accedamus.

*De diminuta Crisi, ac de simplice morborum  
solutione. Cap. XI.*



VM tres sint (vt diximus) spe-  
cies perturbationis morbo-  
rum, quando æger à mor-  
bo liberari debeat (vel enim  
subitò integrè morbus soluitur, vel su-  
bita insigni morbi facta diminutio-  
ne, quod reliquum est paulatim deinceps  
absimitur, vel nulla facta euiden-  
ti mutatione paulatim soluitur) Prioris  
quidem (quæ repentina, ac integra



est morbi solutio ) crisis simpliciter, vel crisis perfectæ optimæue vocatæ, tū cognitionē præsentis, tum futuræ præsentionem, abundè hætenus ac exquisitè docuimus. De reliquis verò duabus iā nunc agere oportet à secunda exordientes; Quæ cum sit subita ac euidentis morbi diminutio, qua manifestè ad melius conuertitur morbus; nō tamē integrè soluitur, non simpliciter crisis vt prior, sed diminuta solūm, imperfectæue crisis nuncupatur ( aliquā. n. morbi portio, post ipsam relinquitur, integrè deinceps paulatim solubilis) Quæ quidem diminuta crisis, ex eo tantūm vno à perfectâ differt; quòd à morbo integrè nō liberat; Huiusmodi autē imperfectio, siue diminutio, ob id sibi contingit, quòd in ipso statu, vti optima, nō fiat, sed antea dirumpatur ( vocat autē sic Hyp. omnia quæ ante statū ad crisis ruunt) dirumpitur autē ante statum,

vel ob miram morbi magnitudinem, vel ob immodicam motus celeritatem, vel ob aliquod aliud extrinsecum irritamentum; Vnde si decimo quarto die spes sit, statū fore, ob morbi verò vehementiam, vel eiusdem velocitatem, vel aliud irritamentum, crisis die vndecimo anticipet; ipsam neque perfectam, neque bonam, sperare quimus; Quinimo eo tēpore penitus timendum, præsertim si neq; ex toto morbus periculo vacet; Quòd si salubris apparuerit, verendum nihilominus est, ne vel crisis cum grauibus fiat accidentibus, vel non integra, vel omnino reuersura; Adeo magnam vim habent cōtiones, ac præterea etiam morbi status. Quare tãto deterior diminuta crisis erit, quàm illa, quæ in statu sit, quanto magis anticipauerit. Et sic præsentis diminutæ crisis cognitio habetur; Ipsa verò adhuc futura existente, num diminuta eueniet,

ex morbi tum vehementia ac celeritate immodica, tū ex extrinseco irritamēto, aliquo modo coniici potest; Nam si horum aliquod, vel plura, vel omnia, morbo per crisim soluendo aderint; crisim statum non expectaturam suspicari possumus; & propterea diminutam fore; quādo eorum nullo, crisim immodicē festinante, ipsa statum expectaret. Quo autem tempore diruptura sit, ex futuri status præcognitione præsentietur; Nam licet certam diem præuidere exquisitè non valeamus; Cum indeterminatus sit vnusquisq; diminutus ac imperfectus naturæ motus; Quòd tamen non multò ante statum huiusmodi crisis fiet, certò præuideri potest; Quando & si mors in tribus temporibus principio. s. augmento & statu, contingat, crisis solū in statu vel parū ante ipsum, fieri possit; Eiusdē verò mos, ac futurus modus ex illis eis-

dem signis præcognoscētur, ex quibus perfectæ crisis futuræ tum morem, tum modū præcognosci docuimus; Et sic qui dē diminutam futuram crīsim, si non exquisitè vt perfectam, artificiosa tamen coniectura præuidere licet; Cuius tū cognitione, tum præuidentiā iam tradita; Tertiæ salubris morborū mutationis institutionē aggrediamur. Quæ cum longiori tēpore, & paulatim fiat, nullo modo crisis nomē meretur, sed tā tū simpliciter solutio vocatur; Nā sicuti vel effatu digna euacuatio, vel oīno abscessus cū veloci perturbatione necessariò in crisi- bus fiūt; ita in solutionibus neq; agitatio aliqua, neq; euacuatio, neq; abscessus accidunt; Quā quidē futurā solutionē, morbi & specie, & more, & vehemētia præse- tire possumus; Nā cū febrilibus tā tū mor- bis crises cōtingant, si citra febrē mor- bus cōstiterit, necnō salubris erit, nō crisi

sed solutione terminabitur, ni virium imbecillitas, ad vsque morbi statum minimè perdurare valens, obstiterit; Similiter cum non omnis febris, sed magna solùm crisi finiri soleat, si parua febris fuerit, soluetur quidem & nō iudicabitur; Quinimo febre quoque magna existente, ni vires satis validæ fuerint, solutionem potius quàm crism suspicari conuenit, validiori nanque facultate ad crism peragendam, quàm ad solutionem, opus est; Futuræ verò solutionis tempus, vniuersalia morbi tempora indicabunt; Nam cum morbos solutione finiendos, omnia huiusmodi tempora pertransire necesse sit, licet solutio maximè in statu fiat, paulatim tamen continuò morbo decrescente, ad extremam vsq; declinationem extenditur; Et sic autem cum quibus rationibus vniuersas morborū salutares mutationes, tum præsentis cognoscere, tum

futuras præuidere, conueniat, docuerimus abundè hucusque; De reliquis, quibus mori accidit, diserere iam prosequamur.

*Quòd quatuor modis mori contingat, ac de eorum  
uniuscuiusque præensione, Cap. XII.*



**I**C V T I tres sunt salubres morborū mutationes, sic tres aliæ perniciosæ istis proportionales opponuntur. Cū moriturus enim est ægrotus, vel subitò moritur, vnà cum turbatione & quibusdam vel excretionibus, vel abscessibus effatu dignis; vel mortem non subit quidem subitò, sed cū multò deterior euaserit, paulatim deinceps moritur. Vocantur autem hæ duæ mutationes crises nō bonæ, siue malæ, scorsum verò, prima exquisitè mala, secunda mala imperfecta, Tertia autē malæ permutationis species est, quæ

citra omnem insignem excretionem , ac  
abscessum, nec nō subitam ad peius cui-  
dentē mutationem , paulatim solūm ad  
mortem vsq; fit, vocatūrque arefactio .  
Verūm & præter hos tres perniciosæ mu-  
tationis modos , aliis tribus salutaribus  
oppositos , quartus quoque alius perni-  
tiosus modus reperitur; Cū scilicet subi-  
tò moritur, absque omni præcedente a-  
gitatione, ac excretionē euidenti, vel ab-  
scessu ; Quamobrē nec crisis modus iste  
vocatur; Ipsum autem ab aliis tribus dif-  
ferre, clarum est; Quando nō parum in-  
ter sit, agitatione præcedentē, cum excre-  
tione insigni, vel abscessu fieri; aut citra  
eorum vnum quódque; Eundem pariter  
salutarium modorū nulli assimilari, cer-  
tū est ; Nemo siquidē vnquā morbum  
subitò euasit sine crisi, vti sine hac pluri-  
mi subitò intereunt . Cum quatuor ergo  
mortis modi sint , eorūq; duo cū crisi  
contin

contingant, alteri verò sine crisi fiant ; de illis qui cum crisi interficiunt , dicemus primùm , deinde verò & de reliquis duobus . Exitia litem itaque crifium præcognitiones valde inftabiles cū ſint, prudente admodum, ac arte inſtructo exercitatōque medico indigent , ſi numquid futuræ ſint, & an hoc certo die , deinde num hominem illico interficient , vel nocebunt tantummodo , prævideri debeat ; Nec in iſtis plurimam reperi incertitudinem , ac quandam ſolū coniecturam, mirum eſt, & ſi in bonis criſibus & firmitas, & ſcientia præualeat ; Determinati nanq̃ ſunt atque ordinati naturæ motus, vbi ipſa valida extiterit , ac materiæ dominetur, & propriis fungitur muneribus; Indeterminati verò atq̃ inordinati, & præterea incogniti, quando illa ſuccumbit; Primùm itaque cum morbum ex ſignis exitioſis, pernicioſum



ram præmōstret, difficulter ipsius futura pernitiōsæ crisis, certam præuidebimus diem; Age enim in quarta die visa primū sit nebula in vrinis nigra, vel suspensio nigra, vel tale aliquid huiusmodi; sint verò & omnia alia signa & accidentia pernitiōsa, morietur quidem penitus hic æger; Sed si in imparibus accessio facta fuerit, septimo die crisis accidet; Si verò ī paribus diebus ī sexto; Certiorē verò tibi faciet expectationē, morbi motus, si enim a cutē moueatur, crisim accelerantem significat, hoc est in sexta venturā; Si verò tardē, ad septimam differetur; At si indicatrix dies, de mala crisi futura signum nullum ostenderit, nequeius futuri temporis præcognitio facilis erit. Verūm si diligenter quantū morbus naturā superat, cōsideraueris, & graues accessiones inspexeris, mortis diem præuidebis; Nam si effatu dignus excess-

sus fuerit, & parum adhuc resistere naturæ vis videatur, mars cito consequetur; Si verò cōtraria affuerint, tardius; Sit igitur exempli gratia, multus excessus, non manifestus tamen, an ad vnum diem, vel duos extendi possit, tunc id accessionum circuitibus distinguetur; Quo. n. die accessio futura est, illo morietur; Mortis verò certam dici horam coniiicies, considerans, quòd quemadmodum in principii, ac declinationis vniuersalis tempore mori cum crisi non contingit, ita nec in principio declinationeue particulari vlla crisis accidit, sed solùm in statu vel in augmento; In quo autem horum, aut in qua eorum parte, crisis fuerit, præcedentium dierum recordatio exquisitius tibi præmonstrabit; Si enim ex ipsa morbi specie, in qua maximè accessionis parte, mors sit futura, præuidere nequeas, ea quæ primis diebus contige-

gere, ad memoriam reuocans, qua hora grauiſſima atque exitialia accidentia ſuperuenire conſueuiſſe cognoueris, hac eadem mortem ſecuturam fore ſuſpicari poteris; Ipſius verò exitialis criſis futurus modus, ex eiſdem præuidetur indi-  
ciis, quibus optimæ criſis futurum modum præcognoſcendum eſſe iam docuimus; Num autem eam ſubita ſequetur mors, vel potius, ſola inſigni facta in deterius mutatione, paulatina demum mors ſuperuentura ſit; ex morbi vehementia, more, motu, ac viribus præcognoſces; Si enim vehemens fuerit morbus, ac valde exitioſus, celerimèque moueatur, & virtus non admodum valida, ac morbus criſim recepturus ſit, ipſa ſubitò omnino interficiet; Si verò iis contraria adfuerint, primam ſolùm euidenter ſubitò in deterius cōuertitur, poſtea autem paulatim quo-

istis. n. præsentibus omnino absq̃z crisi subsequetur mors . At num paulatina vel subita fuerit, morbi vehementiã, improbitatem, ac motũ, ægríq̃z vires perpēdens, præsenties; Nam morbi magnitudine, malitiáq̃z, moderatius vires, non penitus contractas existentes, opprimen- tibus, non subitam sed paulatinam fore mortem sperādum est; Et maximè si tar- dè quoq̃z moueatur morbus; Si verò im- modica morbi & vehementia, & maligni- tas, conspiciatur; virtus verò imbecil- lissima existat, adeo vt plurimum à mor- bo, qui velocissimè quoq̃z moueatur, su- peretur; tunc non solùm sine crisi super- uenerit mors, sed etiã subito . Quibus au- tē vniuersalibus morbi tēporibus, vtra- que accidet, vel modico præuidebitur negocio; Paulatina nanq̃z mors vel in statu, vel in augmento solũ cuenire po- test, cum ipsa semper, vi morbi superata

natura occurrat, ac huiusmodi morbi victoria nō nisi vel statu vel augmento fiat; repentina verò principium non transgrediatur, cum fiat natura, nullo pacto morbo reluctante, sed potius penitus succubente; Quā ob rem in omni vniuersali morbi tempore, declinatione dempta, aliquando mori contingit; in ipsa verò neque vnquā aliquē obuisse visum est, neque id etiam ratio comprobatur; Vbi. n. morbi status præterierit, iam natura superior certē eua sit, aliter namque morbus nō declinasset; Quare nullus adueniētis mortis modus tunc excogitari potest, præterquā ex errore; Sed de hoc haud quam nunc considerare proposuimus, sed an morbi ratione mori accidat; Quæ quidem mors cum semper sit omnimoda naturæ prostratio, si à morbo natura vincatur, nullo penitus modo mori potest; vincitur verò nunquam decli-

natione præfente vniuerfali ; Cum itaqꝫ paulatim euenturam præuiderimus mortem, ipfam vel ftatus, vel augmenti tempore, expectabimus ; Si verò fubita præuifa fuerit futura, in ipfo morbi principio euenerit ; Verùm cum non fatis fit, id folum præuidiffe, qua etiam die, & qua diei hora, vtraque ventura fit, coniectare tentandum eft ; Diem autem præuidebis fi quantò naturam morbus fuperet animaduenteris, ac acceffionum infultũ perfpexeris, fecundum illam eandem rationẽ, quã in præcognitione diciſis pernitiolæ docuimus ; Horam verò aliter, quàm in pernitiola criſi, præcognofcere oportet ; In ea. n. ſemper (vti diximus) mors vel in ftatu vel in augmento acceſſionis, prout corũ alterum grauius affligere confueuerit, aducnit. Mors verò ſine criſi futura, in quouis acceſſionis tempore euenire poteſt ; adeo vt & in

præuideras futuram, ipsam expectabis ;  
Et cum hac eadē ratione, superata .f. natura à morbi vehementia, in augmentis quoque plerunq; moriatur ; num in statu vel in augmento accessionis, & in qua vtriusque certa hora moriendū sit, distingues ; Ad memoriam reuocās, quo tempore & qua maximè hora, grauissīma, atque exitialia accidentia superuenire cōsueuerint, nanq; in illa eadē mortem futuram esse poteris coniicere . Solet autem hæc secunda mortis species, magis cum paulatim moritur accidere quàm cum subitò mori conuenit . Si verò virtute imbecilla existente, ipsam in principio, augmento, ac statu accessionis, perduraturam comprehendere posses ( cū adhuc habitus ipse in vnū compressus contineatur ) declinationis verò tēpore, à medio ad extrema calore retrocedente, naturæ habitum spargendū ac

dissoluendum fore coniiceret; mortē ipsam in declinatione accessions venturā prædicere valeret; Moritur enim sic co tempore (& si per rarō accidat) dissoluto vitali calore; Vnde horum nonnulli subita morte opprimuntur, vt præsentēs animo potius difficere, quā mori existiment; Quidam verō paulatim & nō subitō intereunt; Omnes tamen à statu accessions incipiunt; ita verō latenter, vt multis videātur tales citius quā sperassent, à statu ad declinationē trāsire; Sed manifestissimē ex pulsibus cognoscuntur; Neq3. n. paruo interstitio differunt, qui mortis ratione, citius quā sperabatur, ad quandam falsam declinationem perueniunt, ab his qui verē declinant; In vtrisque enim subitō febrilis calor dissoluitur, fit verō contrariis ex causis, Siquidem naturæ robori maximē contraria est imbecillitas, vche-



mentior igitur fit continuè magis pulsus, & æqualior, atque ordinatior, in optima declinatione, Expellit enim natura fortis omnem subitò febrilem calorem; Debilior verò atque inordinatior, & inæqualis est pulsus in mortilibus declinationibus; Nam vnà cum aliis tunc febrilis calor expirat; atque hinc spes melioris exoritur; Mox verò cum ad leuandum ventrem surrexerint, animi defectum incurrunt, & nonnulli pauco ac tenaci sudore effuso, moriuntur, vel etiam sine surrectione; Et hæc tertia mortis species (quam in declinationibus accessio-num fieri monstrauiamus) tum in his qui paulatim, tum in illis qui subitò moriuntur, euenire conspicitur; Quam ob rem si mortis sine crisi differentias, ex eo quòd, vel paulatim, ac quodammodo natura per aliquod

priores duos modos contuleris, (vti iam mōstrauimus) primam mortis speciem in secundo tantū moriendi modo reperi inuenies, Secundam verò & tertiam plurimū in primo modo accidere, licet nec aliquando, in secundo etiam reperi sit impossibile; Et sic cū vniuscuiusq; tum cum crisi, tum sine crisi moriendi modi, & cognitionē, & præcognitionem exquisitè hoc capite docuerimus,

Huic libro omnium crifium, siue  
vniuersarum morborum mutationum peritiam abundè,  
& exactè complectenti,  
extremam apponamus manum.

FINIS.



